

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2012

Área	Questão	Resposta
CIRURGIA GERAL	1	Extensas áreas de consolidação no lobo superior direito, compatíveis com contusão pulmonar. Observam-se, ainda, pequeno pneumotórax bilateral, pneumomediastino, enfisema de partes moles no hemitórax direito e derrame pleural deste lado
	2	Pancreatite aguda
	3	Pancreatite aguda complicada com pseudocisto pancreático
	4	Ultrassonografia e/ou CPRE
	5	Drenagem percutânea, drenagem e/ou derivações endoscópicas (transgástrica, transduodenal ou transpapilar) e drenagem interna cirúrgica do pseudocisto com o estômago, duodeno ou jejuno.
	6	Aerobilia, Fístula colecisto entérica (duodenal), Obstrução intestinal de delgado por cálculo, Distensão gástrica e do intestino delgado com sinal do “empilhamento de moedas”
	7	Íleo Biliar
	8	Laparotomia exploradora com enterotomia para retirada do cálculo, objetivando a desobstrução do trânsito intestinal.
	9	Infarto enteromesentérico/isquemia intestinal aguda
	10	Laparotomia exploradora/ressecção intestinal
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA	1	citrato de clomifeno
	2	O ideal é classificá-lo antes da cirurgia histeroscópica
	3	adeniose uterina
	4	Pertencem ao grupo de ligamentos de Suspensão.
	5	carcinoma ductal <i>in situ</i>
	6	A) Plano zero de de Lee B) Conjugata diagonalis
	7	A) osso occipital B) Bregma
	8	A) flexão, longitudinal, cefálica e dorso à direita B) Direita transversa ou Direita anterior
	9	A) insinuação B) 45°
	10	A) Desprendimento da cabeça B) Expulsão

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2012

Área	Questão	Resposta
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	1	Podemos afirmar que o aumento relativo do número de pessoas que estavam acima do peso foi muito maior para o quintil de renda inferior do que para o superior em meninos. Nas meninas, as de famílias de menor renda tiveram um aumento enquanto aquelas de famílias de maior renda, na verdade, tiveram uma redução.
	2	O gráfico relaciona a densidade vetorial com a incidência da doença e revela um dos desafios para o controle da dengue, justificando a expectativa de novas epidemias. Três em cada quatro municípios brasileiros estão densamente infestados pelo mosquito <i>A aegypti</i> , o principal vetor da dengue. A incidência anual entre 1986 e 2010 variou de 35 casos por 100.000 habitantes a 428 casos por 100.000 habitantes.
	3	Os pedestres formam a maior categoria de óbitos relacionados ao trânsito, mesmo com a redução de 40% em relação ao período do estudo. Em 2007, a mortalidade de pedestres foi de 6 por 100.000; contudo, o pior problema hoje está relacionado aos motociclistas. A proporção dos óbitos por motocicleta no total de óbitos relacionados ao trânsito subiu de 1996 para 2007; o risco aumentou a um ritmo alarmante, com as taxas crescendo de 0,5 para 4,2 por 100.000 habitantes. Contribuiu para esse aumento a imensa expansão da frota de motocicletas do país, que quase dobrou de 2001 a 2005.
	4	Idade superior a um ano e inferior ou igual a quatro anos
	5	Idade superior a quatro anos e inferior ou igual a sete anos e meio.
	6	Encontramos Estados da federação (Paraná, Rio Grande do Sul, Piauí) que não cumpriram em 2010 o recomendado pela EC29, não alocando pelo menos 12% de seu orçamento nas ações de saúde em seu território.
	7	O número mínimo de médicos de plantão em cada UPA 24h III é de 6 médicos, distribuídos entre pediatras e clínicos gerais.
	8	Respostas possíveis na dependência da organização e demanda do sistema de saúde local: (1) - 3 a 4 Ambulâncias com Equipe de Suporte Básico de Vida, já que cada Equipe é dimensionada para 100 a 150 mil habitantes, Ou (2) - 1 Ambulância com Equipe de Suporte Avançado de Vida, já que cada Equipe é dimensionada para 400 a 450 mil habitantes, Ou (3) - 1 Ambulância de cada tipo de Equipe.
	9	O quantitativo de motocicletas a ser distribuído acompanhará o número de ambulâncias habilitadas em cada serviço, preferencialmente, à proporção de uma motocicleta para cada Unidade de Suporte Avançado (USA) e uma a cada duas Unidades de Suporte Básico (USB).
	10	Cilindro de oxigênio de alumínio compatível com o volume do baú de carga ou da mochila própria para transporte; Colar cervical (P, M, G);- Desfibrilador externo automático (DEA); Material de via aérea básica (cânula de Guedel, máscara de oxigênio com reservatório, cateteres de O ² , ressuscitador manual adulto/infantil com reservatório); Oxímetro portátil; e Equipamento de proteção individual completo (tanto os itens previstos para a área da saúde quanto os necessários para a segurança na condução de motocicletas).

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2012

Área	Questão	Resposta
CLÍNICA MÉDICA	1	Síndrome clínica de insuficiência cardíaca congestiva
	2	Cardiopatia reumática crônica
	3	Internação, restrição hídrica, furosemida EV, IECA , Espironolactona, Heparina profilática. (a opção por iniciar nesta etapa beta bloqueador deve também ser considerada)
	4	Pressão hidrostática aumentada
	5	ambos aumentados
	6	hiperinsuflação pulmonar, retificação e alargamento espaços intercostais, rebaixamento diafragma, aumento espaço aéreo retroesternal no perfil.
	7	o paciente apresenta hipocratismo digital. Em um contexto de DPOC tipo enfisematoso, deve-se suspeitar de câncer de pulmão. A resposta correta é “câncer de pulmão”. Não aceitar apenas DPOC
	8	Espondilite anquilosante
	9	Teste de Shober. O paciente, em posição ortostática, marca a quinta vértebra lombar. A seguir, faz uma medida/marcação de 10 cm na linha vertical em direção cefálica. Pedese ao paciente para fletir o tronco para frente. Se houver aumento inferior a 5 cm nesta distância/linha, é indicativo de maior rigidez na coluna vertebral e corrobora o diagnóstico de espondilite anquilosante
	10	Deve ser administrado anti-inflamatório não-esteroidal, como indometacina, por exemplo. Não está indicado corticoide nem infliximab nesta fase da doença
PEDIATRIA	1	Síndrome Mão/Pé/Boca -- vírus Coxsackie, principalmente pela variedade A16
	2	É sintomático. Inclui medidas orientadas para as viroses de uma maneira geral: repouso, alimentação leve, boa ingestão de líquidos
	3	Tratamento da crise hipoxêmica: oxigênio, flexão dos membros, morfina e hidratação venosa.
	4	Tetralogia de Fallot
	5	Púrpura Trombocitopênica Idiopática - PTI
	6	Alta com orientação para diminuição do intervalo das mamadas, estímulo à eliminação de mecônio e acompanhamento ambulatorial de provável icterícia fisiológica;
	7	Polipose juvenil
	8	Polipectomia através da colonoscopia
	9	Varicela
	10	Manobra de Ortolani - Diagnóstico da luxação ou subluxação congênita do quadril.