

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2014

Área	Questão	Melhor Resposta
CIRURGIA GERAL	1	Presença de ar em vias biliares intrahepáticas e na vesícula biliar/Imagem sugestiva de cálculo de colédoco/calcificação da aorta com desvio
	2	Fístula bileodigestiva possivelmente por litíase biliar
	3	Papilotomia endoscópica para retirada do cálculo e/ou Realizar colecistectomia no segundo tempo
	4	Paraganglioma
	5	Dosagem da concentração de metanefrina e da normetanefrina / teste de supressão com clonidina / teste de estímulo com glucagon
	6	Cintilografia com I 126 - MIGB
	7	Controle da HÁ com uso de bloqueador alfa adrenérgico/ uso ocasional e bloqueador betaadrenérgico para controle de taquicardia e taquiarritmia reflexa, se necessário
	8	Caverna no lobo superior esquerdo; infiltrado pulmonar difuso; pneumoperitônio; níveis hidroaéreos; opacificação da borda do psoas; hipotransparência abdominal difusa
	9	Tuberculose intestinal / Diagnóstico diferencial: perfuração dorcitomegalovírus
	10	Sonda nasogátrica, acesso venoso, reposição volêmica, antibiotico, exames laboratoriais
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA	1	Molusco contagioso
	2	Poxvírus
	3	Gravidez tubária
	4	HCG
	5	Salpingostomia linear
	6	Evolução fisiológica, sem intercorrências
	7	Translucência nual. Entre 11 e 14 semanas.
	8	Longitudinal, cefálica, occipito-ilíaca esquerda anterior
	9	Cirurgia de B-Lynch. Atonia uterina.
	10	Interrupção da gestação por cesariana.

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2014

Área	Questão	Melhor Resposta
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	1	A atenção integral à saúde do homem pressupõe: (a) Existência de cadastro atualizado da população masculina do território; (b) Busca ativa pela equipe para realização de, pelo menos, uma consulta/ano para homens entre 20 e 59 anos; (c) Ações de orientação e sensibilização da população masculina de 40 a 59 anos para medidas de detecção precoce do câncer de próstata em pacientes sintomáticos e disfunção erétil, entre outros agravos do trato geniturinário; (d) Oferta de atendimento em horários alternativos adequados; (e) Ações de integração dos homens nas atividades educativas de planejamento familiar; (f) Ampliação da participação paterna no pré-natal, parto, puerpério e desenvolvimento da criança; (g) Oferta de exames previstos para homens que participam do pré-natal masculino; (h) Ações de identificação, acolhimento e encaminhamento em situações de violência envolvendo homens; (i) Ações educativas para prevenção de violências e acidentes e uso de álcool e outras drogas, orientadas especificamente para a população masculina.
	2	Média de atendimentos de tuberculose e Média de atendimentos de hanseníase.
	3	Realização do teste rápido da sífilis na Atenção Básica no âmbito da Rede Cegonha.
	4	Adesivo transdérmico, (7, 14 e 21mg), Goma de mascar de Nicotina (2mg), Pastilha de Nicotina (4mg, 2mg na RENAME2013) e Cloridrato de Bupropiona (150mg).
	5	a) Suporte Ventilatório não invasivo (Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas (CPAP) ou Pressão Aérea Positiva por dois Níveis (BIPAP)).b) Diálise peritoneal ou c) Paracentese
	6	Oficinas Ortopédicas
	7	Estudo caso-controle
	8	Há risco aumentado de infecção nos homens diabéticos e este resultado tem significância estatística, mesmo após o ajuste para fatores de confundimento
	9	Estudo foi uma Revisão Sistemática com Metaanálise
	10	Detectou diferença não significativa entre os dois grupos de antibióticos, com heterogeneidade praticamente nula

GABARITO - PROVA MULTIMÍDIA 2014

Área	Questão	Melhor Resposta
CLÍNICA MÉDICA	1	Sepse grave por pneumonia ou choque séptico por pneumonia ou sepse pulmonar grave
	2	PIPERACILINA com TAZOBACTAM.ou CEFEPIME / Em até 1 hora do diagnóstico de sepse grave/choque séptico
	3	tamanho dos rins; anemia; doença óssea; relação ureia c/ creatinina; tempo de instalação da doença.
	4	Solução cristalóide ou soro fisiológico 0,9% ou ringer lactato
	5	Endocardite bacteriana
	6	Estreptococos viridans, aureus - Enterococcus
	7	Hemocultura - Ecocardiograma
	8	Congestão pulmonar – cardiomegalia - Presença de nódulo em lobo superior esquerdo
	9	Miocardite viral
	10	Tratamento da insuficiência cardíaca (diurético, aldactona) + antibioticoterapia
PEDIATRIA	1	Talassemia
	2	Hepato-esplenomegalia, desnutrição, baixa estatura, malares proeminentes hipocromia, hemácias em alvo.
	3	Radiografia abdominal frontal mostra acentuada dilatação e ausência de ar no reto. Em posição sentada, evidenciam-se níveis líquidos. Enema baritado evidencia obstrução intestinal distal e zona de aganglionose colônica. / Doença de Hirschsprung.
	4	Cânula traqueal
	5	Coquelucha
	6	Leucocitose acentuada e linfocitose
	7	Macrolídeo
	8	Cefalohematoma
	9	Injúria intencional / síndrome da criança espancada
	10	Fenômeno de Arlequin