

GABARITO – PROVA MULTIMÍDIA 2015

Área	Questão	Melhor Resposta
CIRURGIA GERAL	1	Presença de gás na parede abdominal à esquerda, na bolsa escrotal até a raiz do pênis. Edema de partes moles.
	2	Gangrena de Fournier, processo infeccioso grave de bolsa escrotal e períneo.
	3	Antibiótico terapia venosa, visando bactérias gram negativas e anaeróbicas, desbridamento cirúrgico amplo para cicatrização em segunda intenção. Pode ser acrescentada colostomia concomitante, se for o caso (se o desbridamento atingir o anus).
	4	Acúmulo de fezes no cólon direito, invaginação do cólon para o reto.
	5	Intussuscepção ou invaginação do cólon para o reto, por provável tumor de cólon.
	6	NÃO
	7	Exames pré operatórios imediatos, antibioticoterapia, laparotomia exploradora com redução da invaginação, palpação minuciosa do segmento intestinal reduzido e, em caso de presença de tumoração palpável após a redução, colectomia com ou sem anastomose.
	8	Pancreatite aguda biliar
	9	Imagem de mostrando pseudocisto de pâncreas / Coleção líquida pancreática
	10	Drenagem por punção percutânea guiada por US ou TC / Drenagem por endoscópica por punção transgátrica/ Cistogastrostomia endoscópica / cistogastrostomia por laparotomia
Área	Questão	Melhor Resposta
GINECOLOGIA & OBSTETRÍCIA	1	Colo uterino III B
	2	Câncer de vulva/ realizar biopsia da lesão.
	3	O oforoplastia esquerda por laparoscopia
	4	Hipermenorreia com coágulos
	5	Tem com queixa clínica dor incapacitante no baixo ventre
	6	Desaceleração Tardia (ou DIP II)
	7	Hipóxia fetal (ou Sofrimento Fetal)
	8	Fase ativa prolongada
	9	Ocitocina venosa para acelerar a resolução do parto
	10	Útero de Couvelaire (apoplexia miometrial) e descolamento prévio de placenta (DPP)
Área	Questão	Melhor Resposta
MEDICINA PREVENTIVA E SOCIAL	1	Meta-análise
	2	Os 6 ensaios eram bem heterogêneos. Ao orientar as pacientes, devemos explicar as limitações dos resultados
	3	1. Ter uma Política de Aleitamento Materno.2. Capacitar toda a equipe de cuidados de saúde nas práticas necessárias para implementar esta política.3. Informar todas as gestantes sobre os benefícios e o manejo do aleitamento materno.4. Ajudar as mães a iniciar o aleitamento materno na primeira meia hora após o nascimento.5. Mostrar às mães como amamentar e como manter a lactação mesmo se vierem a ser separadas dos filhos.6. Não oferecer a recém-nascidos bebida ou alimento que não seja o leite materno, a não ser que haja indicação médica e/ou de nutricionista.7. Praticar o alojamento conjunto, permitir que mães e recém-nascidos permaneçam juntos 24 (vinte e quatro) horas por dia.8. Incentivar o aleitamento materno sob livre demanda.9. Não oferecer bicos artificiais ou chupetas a recém-nascidos e lactentes.10.Promover a formação de grupos de apoio à amamentação.
	4	1. Respeito ao direito da mulher à privacidade no local do parto.2. Apoio empático pelos prestadores de serviço durante o trabalho de parto e parto.3. Respeito à escolha da mulher sobre seus acompanhantes durante o trabalho de parto e parto.4. Fornecimento às mulheres sobre todas as informações e explicações que desejarem.5. Oferta de líquidos por via oral durante o trabalho de parto e parto.6. Monitoramento fetal por meio de ausculta intermitente.7. Monitoramento cuidadoso do progresso do parto, por exemplo, por meio do uso do partograma da OMS.8. Monitoramento do bem-estar físico e emocional da mulher durante trabalho e parto e ao término do processo de nascimento.9. Métodos não invasivos e não farmacológicos de alívio da dor, como massagem e técnicas de relaxamento, durante o trabalho de parto.10. Liberdade de posição e movimento durante o trabalho de parto.11. Estimulo a posições não supinas durante o trabalho de parto.12. Administração profilática de ocitocina no terceiro estágio do parto em mulheres com risco de hemorragia no pós-parto, ou que correm perigo em consequência da perda de até uma pequena quantidade de sangue.13. Condições estéreis ao cortar o cordão.14. Prevenção da hipotermia do bebê.15. Contato cutâneo direto precoce entre mãe e filho e apoio ao início da amamentação na primeira hora após o parto, segundo as diretrizes da OMS sobre Aleitamento Materno.16. Exame rotineiro da placenta e membranas ovulares.

GABARITO – PROVA MULTIMÍDIA 2015

	5	- Acidente de trabalho fatal.- Acidente de trabalho em crianças e adolescentes.- Acidente de trabalho grave/com mutilações.
	6	Benzeno
	7	Para ter acesso ao recurso, está a indicação pelo município de leitos de terapia intensiva (UTI tipo II ou III) e leitos habilitados como Unidade Coronariana, além de referenciar um estabelecimento habilitado em procedimentos de hemodinâmica. Também deve ser informado que os profissionais do SAMU da localidade foram especificamente capacitados para a administração do trombolítico
	8	São elas a Unidade de Suporte Avançado Terrestre (USA), a equipe embarcação (barcos que transitam em rios, geralmente na região amazônica) e a equipe aeromédico (helicóptero ambulância).
	9	Uso de algum tipo de comunicação não-verbal: leitura orofacial; Linguagem Brasileira de Sinais; figuras, desenhos e expressões não verbais. Maior tempo para realização da consulta.
	10	Equidade
Área	Questão	Melhor Resposta
CLÍNICA MÉDICA	1	Nefrolitíase
	2	Imagem de calcificação para vertebral à esquerda, ao nível de loja renal
	3	Controle do trabalho cardíaco (dp/dt) com beta-bloqueador e nitroprussiato de sódio
	4	Aumento da área do medistino superior e aumento da área cardíaca
	5	Cardioversão elétrica sincronizada com 120-200J (bifásico) ou 150-200J (monofásico).
	6	Distensão/aumento da vesícula biliar e dilatação das vias biliares intrahepáticas
	7	Tumor periampular ou Ca Pâncreas .
	8	Crioglobulinemia
	9	Proteinúria, Cilindros hemáticos, hemácias dismórficas.
	10	Sorologia para hepatite C (ou anti-HCV).
Área	Questão	Melhor Resposta
PEDIATRIA	1	Galactosemia
	2	Persistente moderada
	3	Injeção de 1 mg de vitamina K
	4	Prevenir a doença hemorrágica neonatal
	5	BCG, pentavalente, vacina oral contra poliomielite, tríplice viral.
	6	Peritonite espontânea
	7	Estreptococo pneumoniae
	8	Síndrome mão-pé-boca
	9	Enterovirus, também denominado Coxsackie virus
	10	Parvovirose B 19 ou eritema infeccioso