

PROCESSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA EM CIRURGIA TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO - FACIAL - 2021

Prova a ser realizada pelos candidatos graduados em **ODONTOLOGIA**

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste CADERNO DE QUESTÕES, você deverá ter recebido o CARTÃO DE RESPOSTAS com o seu nome e o número de inscrição. Confira se seus dados estão corretos e, em caso afirmativo, assine o Cartão e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas 40 (quarenta) questões.
 - 01 a 05 – Sistema Único de Saúde
 - 06 a 35 – Conhecimentos Específicos
 - 36 a 38 – Língua Portuguesa
 - 39 a 40 – Língua Estrangeira
- Cada questão proposta apresenta quatro opções de resposta, sendo apenas uma delas a correta. A questão que tiver sem opção assinalada receberá pontuação zero, assim como a que apresentar mais de uma opção assinalada, mesmo que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido usar qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta.
- Não é permitido copiar as opções assinaladas no Cartão de Respostas.
- O tempo máximo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do Cartão de Respostas, é de **duas horas** e o mínimo é de **uma hora e trinta minutos**.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o Cartão de Respostas, usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente de ponta média com tinta azul ou preta (preferencialmente, com tinta azul).
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO DE RESPOSTAS, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS NO QUADRO
“EXAME GRAFOTÉCNICO”

***A cura está ligada ao tempo e às vezes também às circunstâncias.
Hipócrates.***

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

01 A partir da Lei 8080, foi criado o Sistema Único de Saúde, e ali estão descritos os suas diretrizes e seus princípios. Dessa forma, marque a opção correta em relação aos princípios constitucionais do SUS.

- (A) Equidade: confere ao Estado o dever do “atendimento integral, porém com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais”.
- (B) Universalidade: considera a saúde como um “direito de todos e dever do Estado” se colocando como um direito fundamental de todo e qualquer cidadão.
- (C) Integralidade: A partir do texto constitucional de que “saúde é direito de todos”, previsto no artigo 196 da Constituição, esse princípio busca preservar o postulado da isonomia, visto que a própria Constituição, em Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, artigo 5º, institui que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.
- (D) Participação Social: o Sistema Único de Saúde está presente nas três esferas do governo - União, Estados, Distrito Federal e Municípios - de forma que, o que é da alçada de abrangência nacional será de responsabilidade do Governo Federal, o que está relacionado à competência de um Estado deve estar sob responsabilidade do Governo Estadual, e a mesma definição ocorre com um Município.

02 "Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências." Essa descrição corresponde à seguinte Lei Federal:

- (A) 7.508/11
- (B) 8.069/90
- (C) 8.080/90
- (D) 8.142/90

03 De acordo com o Art. 2º da Lei Federal 8142/90, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como

- (A) despesas provenientes de capital privado incluídos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.
- (B) investimentos previstos em lei orçamentária municipal, estadual e incentivos privados, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- (C) despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- (D) investimentos direcionado a programas de tecnologias em saúde.

04 De acordo com a Constituição Federal de 88, todas as afirmativas abaixo estão corretas, **exceto** uma. Identifique-a.

- (A) As instituições privadas não poderão participar de forma complementar do Sistema Único de saúde, segundo diretrizes deste, nem mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
- (B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da Lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
- (C) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
- (D) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

05 De acordo com a Lei Federal nº 8080, de 19/09/90, a saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros:

- (A) transporte, lazer, acesso aos bens e serviços essenciais.
- (B) alimentação, moradia, saneamento básico.
- (C) educação, meio ambiente, trabalho.
- (D) todas as opções anteriores.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

06 O músculo orbitário que não se origina no anel tendinoso comum é o

- (A) reto superior.
- (B) oblíquo inferior.
- (C) reto lateral.
- (D) reto inferior.

07 Em paciente com fissura lábio palatal, o reparo do lábio deve ocorrer idealmente em na faixa etária de

- (A) um a três meses.
- (B) três a seis meses.
- (C) seis meses a um ano.
- (D) um a dois anos.

08 A síndrome causada por mutação do receptor 2 do FGFR2, que apresenta como características acrobraquicefalia, hipoplasia da maxila, sindactilia, é a síndrome de

- (A) Crouzon.
- (B) Gardner.
- (C) Apert.
- (D) Romberg.

09 Aponte a opção que apresenta um espaço fascial secundário.

- (A) Submandibular
- (B) Bucal
- (C) Sublingual
- (D) Pterigomandibular

10 Sobre o reflexo óculo cardíaco, é correto afirmar que

- (A) trata-se de um reflexo vago trigeminal.
- (B) não ocorre em cirurgias da cavidade orbitária.
- (C) ocorre alteração da pressão arterial como principal consequência.
- (D) não ocorre extrassístoles ventriculares (PVCs).

11 Os testes que monitoram o sistema extrínseco da coagulação são os seguintes:

- (A) TAP, PTT.
- (B) tempo de protrombina, INR.
- (C) coagulograma, INR.
- (D) tempo de protrombina, coagulograma.

12 A dose máxima de lidocaína 2%, com 1/100.000 de adrenalina (em mg), que pode ser administrada em um homem de 68 kg, hígido, é de

- (A) 340 mg.
- (B) 408 mg.
- (C) 476 mg.
- (D) 544 mg.

13 Todos os opioides citados a seguir estimulam a liberação de histamina, **exceto**

- (A) morfina.
- (B) fentanil.
- (C) codeína.
- (D) meperidina.

14 Assinale a opção que apresenta uma possível complicação transoperatória associada à realização de uma traqueostomia.

- (A) Enfisema subcutâneo
- (B) Pneumonia
- (C) Atelectasia
- (D) Estenose traqueal

15 A principal neoplasia de glândula salivar maior em adultos é conhecida como

- (A) mucocele.
- (B) tumor de Warthin.
- (C) adenocarcinoma.
- (D) adenoma pleomórfico.

16 A abordagem de uma fratura subcondilar pode ser realizada de todas as formas a seguir, **exceto** por meio

- (A) intraoral.
- (B) retromandibular.
- (C) pré-auricular.
- (D) submandibular (transmassetérico).

- 17** Uma causa idiopática de paralisia facial denomina-se
- (A) herpes zoster ótico
(B) mastoidite coalescente
(C) colesteatoma
(D) síndrome de Melkersson- Rosenthal
- 18** Assinale a opção que apresenta uma síndrome associada a hipodontia.
- (A) Turner
(B) Displasia cleidocraniana
(C) Klippel Trenaunay Weber
(D) Nance Horan.
- 19** Com relação às hiperplasias condilares, pode-se afirmar que
- (A) o diagnóstico de hiperplasia ativa ou inativa pode ser feito exclusivamente por meio de cintilografia óssea de ATM.
(B) tumores nem sempre devem ser cogitados como diagnóstico diferencial.
(C) a ressonância magnética é o exame de imagem padrão-ouro na determinação das mesmas.
(D) o desvio de mento progressivo é a queixa mais comumente encontrada entre os pacientes que apresentam hiperplasia condilar ativa.
- 20** Constitui indicação para abordagem de urgência em fraturas orbitais a ocorrência de
- (A) proptose de bulbo ocular.
(B) hematoma retrobulbar.
(C) quemose com impossibilidade de oclusão palpebral.
(D) restrição de movimentação ocular.
- 21** São indicações absolutas para exodontia de dentes que se encontram no traço de fratura mandibular, **exceto**:
- (A) fraturas sem deslocamento, porém associadas a dente semi-irrompido.
(B) grande mobilidade do dente.
(C) presença de doença periodontal/caries extensas.
(D) impedimento da redução da fratura pelo dente em questão.
- 22** Várias lesões situadas nos ossos gnáticos respondem ao tratamento cirúrgico conservador. A lesão que apresenta maior tendência à recidiva após curetagem ou enucleação é o
- (A) tumor odontogênico adenomatoide.
(B) fibro-odontoma ameloblástico.
(C) cisto odontogênico glandular.
(D) tumor odontogênico de células granulares.
- 23** Em relação à distração osteogênica mandibular, pode-se afirmar que
- (A) a ativação/dia deve ser de 2mm.
(B) o tempo de latência deve ser em torno de sete dias.
(C) é desnecessário um período de consolidação para se remover o distrator.
(D) é dispensável a preocupação com germes dentários durante a osteotomia para instalação do distrator.
- 24** A estética facial é um importante fator motivacional para a procura do tratamento cirúrgico e ortodôntico. Para se obter um resultado satisfatório, é necessária a associação entre uma face agradável e uma oclusão funcional. A avaliação do perfil vertical da face através da exposição dos incisivos superiores em repouso é um dos critérios para esse resultado. A mensuração aceita para homens e mulheres, respectivamente, são:
- (A) 0 a 3 mm nos homens e 0 a 4 mm nas mulheres.
(B) 0 a 2 mm nos homens e 0 a 4 mm nas mulheres.
(C) 0 a 4 mm nos homens e 0 a 2 mm nas mulheres.
(D) 0 a 2 mm nos homens e 0 a 3 mm nas mulheres.

25 A suspeita de que um paciente seja portador de uma discrasia sanguínea está dentre as raras situações em que exames laboratoriais pré-operatórios estão indicados para um procedimento cirúrgico oral. Dentre os exames laboratoriais que devem ser solicitados na triagem de uma discrasia sanguínea, encontra-se o tempo de sangramento (TS). A função laboratorial desse exame é a avaliação

- (A) da via extrínseca.
- (B) qualitativa das plaquetas.
- (C) da via intrínseca.
- (D) quantitativa das plaquetas.

26 Paciente chega ao consultório com trismo significativo, necessitando de cuidados odontológicos. Nessa situação, pode-se realizar uma técnica anestésica de bloqueio mandibular de boca fechada denominada bloqueio mandibular de

- (A) Gow-Gates.
- (B) Wolfe-Gates.
- (C) Klokkevold.
- (D) Vazirani-Akinosi.

27 Assinale a opção que apresenta lesão oral, fortemente associada à infecção pelo HIV.

- (A) Leucoplasia pilosa
- (B) Estomatite ulcerativa necrosante
- (C) Púrpura trombocitopênica
- (D) Hiperpigmentação melânica

28 Todas as opções apresentam um sinal de osteíte localizada (alvéolo seco), **exceto**:

- (A) odor fétido.
- (B) mau hálito.
- (C) sangramento alveolar.
- (D) local da extração com cicatrização deficiente.

29 Com relação às fraturas de face em pacientes pediátricos, assinale a opção correta.

- (A) Está indicado um amplo descolamento periosteal na área.
- (B) Está indicado o uso de material de fixação absorvível para todos os tipos de fraturas nessa faixa etária de paciente.
- (C) Está contraindicado o uso de enxerto em áreas de perda óssea.

(D) Está indicado a realização de reparo cuidadoso das injúrias de tecido mole, principalmente o periosteio.

30 São características clínicas da síndrome de Garner, **exceto**:

- (A) múltiplos osteomas.
- (B) pólipos intestinais.
- (C) macroglossia.
- (D) cistos epidérmicos.

31 Em relação ao comportamento biológico do ameloblastoma, é correto afirmar que

- (A) o tipo sólido convencional não mostra acentuada tendência a recidiva.
- (B) esses tumores têm crescimento lento e são localmente invasivos.
- (C) a variante desmoplásica é considerada maligna com expressiva atipia celular.
- (D) é uma neoplasia que frequentemente se associa com metástases para linfonodos da região cervical.

32 Durante o exame de um paciente politraumatizado, observa-se uma equimose retroauricular. A denominação desse sinal clínico e sua possível causa são, respectivamente,

- (A) sinal de Paul-Vicent / laceração das vias aéreas superiores.
- (B) sinal de Hamsey-Hunt / lesão de conduto auditivo.
- (C) sinal de Battle / fratura de crânio.
- (D) sinal de Parinaud / síndrome do ápice orbitário.

33 Considerando-se a cirurgia para osteotomia vertical do ramo da mandíbula, é correto afirmar que

- (A) a principal indicação dessa cirurgia é a correção de prognatismo mandibular.
- (B) sua grande desvantagem é que só pode ser realizada por acesso extraoral.
- (C) deve ser evitada em recuos mandibulares porque apresenta incidência de lesão do nervo alveolar inferior consideravelmente maior do que a técnica de osteotomia sagital.
- (D) sua principal vantagem é a facilidade de fixação interna rígida devendo-se utilizar preferencialmente duas placas para sua fixação.

34 A classificação de Pell e Gregory para inclusão de terceiros molares é muito utilizada no meio da especialidade de cirurgia. Considerando essa classificação e suas correlações, assinale a opção correta.

- (A) Quando o plano oclusal do terceiro molar inferior estiver entre o plano oclusal e o plano cervical do segundo molar vizinho, classifica-se como classe 2.
- (B) Quando a metade da coroa de um terceiro molar estiver coberta pela porção anterior do ramo mandibular, classifica-se como classe 2.
- (C) Os terceiros molares superiores são classificados em relação ao plano oclusal dos segundos molares vizinhos como classes 1, 2 e 3.
- (D) Quando a metade da coroa de um terceiro molar inferior estiver coberta pela porção anterior do ramo mandibular, classifica-se como classe 2.

35 Neoplasia nos maxilares que histopatologicamente apresenta-se semelhante a papila dentária de um dente em desenvolvimento. Apresenta crescimento lento, comportamento agressivo e alta taxa de recorrência. Radigraficamente apresenta-se como uma área radiolúcida unilocular ou multilocular, apresentando delicadas trabéculas ósseas organizadas em ângulo reto um ao lado do outro. Assinale a alternativa que corresponde a essa descrição.

- (A) Tumor odontogênico epitelial calcificante
- (B) Mixoma odontogênico
- (C) Ameloblastoma
- (D) Tumor odontogênico adenomatoide

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia com atenção o fragmento de texto seguinte, extraído da crônica “Sexta Black”, de Luana Génot, Revista Ela – O GLOBO, 29 de novembro de 2020, p.14.

TEXTO:

Na sua opinião, Black Friday é um termo racista? Para alguns, este questionamento representa: “Ai, que mimimi. Tudo agora é racismo!”. Para outros, é tempo de repensar e 5 resignificar os usos deste e de outros termos que podem estar associados a um contexto racista. Estou com este grupo. E, independentemente de qual seja o seu pensamento, acho que cabem reflexões sobre o 10 tema.

Há diversas teorias que explicam o início do uso da expressão. Uma das mais populares é que Black Friday seria, nos Estados Unidos, o dia seguinte à quinta-feira de Ação de Graças, 15 no final do mês de novembro. Essa data marca o início das compras de Natal. Isso significaria que os números do comércio sairiam do vermelho e ficariam no lucro, marcado pela cor preta.

Já li também histórias que detectam, em 20 1869, o primeiro uso do termo Black Friday, associado à quebra do mercado do ouro nos EUA, que teria provocado uma enorme crise financeira e a falência dos ricos de Wall Street. A crise é, portanto, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.

Há outras teses que alegam que, por volta dos anos 1800, proprietários de plantações do 30 Sul dos Estados Unidos podiam comprar escravos com desconto na sexta-feira, logo após o famoso Dia da Ação de Graças. E essa teoria, apesar das controvérsias e, para muitos, falta de provas históricas, tem sido a base de 35 argumentos de boicotes ao feriado e ações de varejistas, acusadas de reforçar elementos escravocratas nos dias de hoje.

O certo é que o período de promoções das varejistas já não é o mesmo.

[...]

36 A estrutura textual predominante no fragmento anterior é a

- (A) injuntiva
- (B) expositiva
- (C) argumentativa
- (D) descritiva

37 “A crise é, portanto, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.” (linhas 25-27)

A substituição do conectivo MANTÉM o sentido do enunciado acima em:

- (A) A crise é, por conseguinte, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.
- (B) A crise é, entretanto, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.
- (C) A crise é, no entanto, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.
- (D) A crise é, todavia, associada ao termo Black, neste contexto de uma sexta-feira de vacas magras.

38 “E essa teoria, apesar das controvérsias e, para muitos, falta de provas históricas, tem sido a base de argumentos de boicotes ao feriado e ações de varejistas, acusadas de reforçar elementos escravocratas nos dias de hoje.” (linhas 32-37)

A expressão “essa teoria” tem função coesiva e retoma

- (A) o reforço de elementos escravocratas hoje em dia.
- (B) o aumento de argumentos de boicotes ao feriado e ações de varejistas.
- (C) a compra de escravos com desconto, na sexta-feira, após o Dia de Ação de Graças.
- (D) a constatação de que o período de promoções das varejistas não é o mesmo.

LÍNGUA ESPANHOLA

Lee el siguiente texto y escoge la opción correcta en las cuestiones formuladas seguidamente:

La vacunación es la mejor arma contra la pobreza

La desinformación irresponsable de los antivacunas ignora a quienes tienen más que perder si no se inmunizan: los más pobres y vulnerables, que corren el riesgo de morir si ellos o sus familias se enferman

Una encuesta reciente detectó que uno de cada tres estadounidenses no estaría dispuesto a recibir una vacuna contra la covid-19. Mientras, el movimiento antivacunas supuestamente ganó al menos 7,8 millones de nuevos seguidores en las redes sociales desde 2019. Al igual que la propia pandemia, la desinformación y los rumores antivacunas no conocen fronteras. La mayor tragedia es que la reticencia a la inmunización amenaza con perjudicar más a los pobres.

Ellos ya son los más golpeados por la pandemia: perdieron vidas, su sustento y el acceso a la nutrición y la atención sanitaria. Una cantidad cada vez mayor de mujeres y niños de poblaciones marginadas está quedando fuera del alcance de los servicios públicos, según queda reflejado en la mayor incidencia de violencia de género, el aumento de embarazos de adolescentes y la menor asistencia de parteras. En los próximos seis meses podrían morir un millón más de niños debido a las repercusiones de la pandemia; la mayor parte de estas muertes tendría lugar entre los desfavorecidos.

Las vacunas protegen hasta tres millones de vidas cada año porque a menudo son el primer y único servicio de salud que llega a los hogares sin recursos. Quienes viven en condiciones miserables, desprovistos de instalaciones básicas de saneamiento, agua segura para beber, higiene, productos de limpieza y nutrición adecuada, tienen mayor riesgo de contraer enfermedades que las vacunas podrían prevenir

y de morir por esas afecciones. Y cuando están enfermos, suelen carecer de los medios financieros para acceder a la atención sanitaria. La protección oportuna con vacunas, que mantiene bajo control las enfermedades en las comunidades pobres y reduce las muertes infantiles prevenibles es, por lo tanto, su mejor opción para la supervivencia.

ANURADHA GUPTA
01 NOV 2020 - 21:10 BRST

FUENTE: <https://elpais.com/planeta-futuro/2020-11-02/la-vacunacion-es-la-mejor-arma-contr-la-pobreza.html>

39 Según la autora del texto, la falta de vacunación afecta más gravemente a las personas pobres porque

- (A) ganan su sustento gracias a las medidas adoptadas por las autoridades competentes.
- (B) viven en condiciones más precarias y están más expuestas a enfermedades infecciosas.
- (C) tienen más incidencia de violencia de género y un mayor número de adolescentes embarazadas.
- (D) hacen uso de los servicios de salud públicos aunque viven en hogares sin recursos económicos.

40 Para Anuradha Gupta, las vacunas son importantes para la población más pobre porque suelen ser

- (A) una oportunidad de sustento.
- (B) una violencia cometida contra ella.
- (C) el único servicio de salud que reciben.
- (D) la mayor tragedia para la inmunización.

LÍNGUA INGLESA



World Health Organization

REGIONAL OFFICE FOR THE **Eastern Mediterranean**

Frontline workers and COVID-19

Going to work during this COVID-19 pandemic has placed frontline workers under immense and unprecedented pressure. Exposure to excessive stress, for prolonged periods, can have many harmful consequences on the emotional and mental well-being of frontline workers. It can: lead to burnout syndrome; trigger common mental disorders such as depression and anxiety or post-traumatic stress disorder (PTSD); result in unhealthy behaviours, like the frequent use of tobacco, alcohol or other substances; result in frequent absence from work or reduced productivity while at work.

While many of the efforts to reduce stress and care for frontline workers must be made by organizations, managers and health administrators, frontline workers can also take the following actions to cope with stress.

- Identify which things are within your control, and which challenges you have no control over.
- Stay connected.
- Exchange support with trusted colleagues at work, as many may be having similar experiences.
- Maintain a healthy lifestyle: healthy diet and exercises.
- Rest during any downtime at work and get enough sleep between shifts.
- Avoid using tobacco, alcohol or other substances.
- Practice techniques like breathing exercises, relaxation, meditation.
- Know your limits.
- Seek help from a health professional if your feelings of distress persist and it becomes difficult to cope with your daily activities at work or at home. This could be your doctor or a psychiatrist or therapist.

Adapted from: <http://www.emro.who.int/mnh/news/frontline-workers-and-covid-19-coping-with-stress.html>.
 Access: 10 Jan 2020.

Glossary: frontline workers: profissionais da “linha de frente”; *harmful*: prejudiciais, danosas; well-being: bem-estar; *lead to*: levar a; *burnout syndrome*: estafa; *trigger*: desencadear; *trusted*: confiáveis; *breathing*: respiração; *seek*: procure.

39 “*Burnout syndrome, depression, anxiety or PTSD; frequent use of tobacco, alcohol or other substances and frequent absence from work*” are used in the text as examples of:

- (A) different types of action that can be taken for dealing with excessive stress for prolonged periods during the COVID-19 pandemic.
- (B) suggested causes of the unprecedented pressure put on frontline workers during the COVID-19 pandemic.
- (C) unforeseen collateral effects of suggested actions to cope with the excessive exposure to stress during the COVID-19 pandemic.
- (D) possible emotional and mental consequences of the frontline workers’ exposure to excessive stress during the COVID-19 pandemic.

40 Some of the suggestions for frontline workers to cope with stress are:

- (A) to maintain a healthy diet; to practice techniques like relaxation and meditation; to get enough sleep between shifts.
- (B) to get help from a health professional; to consume alcohol or other substances; to reduce productivity at work.
- (C) to seek help from managers and health administrators; to exchange support with trusted colleagues at work; to know the patients’ limits.
- (D) to avoid resting during any downtime at work; to practice techniques like breathing exercises; to be frequently absent from work.

