

**ANÁLISES DOS RECURSOS DO CONCURSO DE SELEÇÃO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E EM ÁREA
PROFISSIONAL DA SAÚDE – COREMU – 2021**

Programa de Residência: Residência FARMÁCIA HOSPITALAR

QUESTÃO	JUSTIFICATIVA DA BANCA	Recurso deferido ou indeferido	RESPOSTA AO RECURSO (Gabarito mantido ou alterado ou questão anulada)
23	As referências para a questão não estavam no Edital	Deferido	Questão Anulada
24	A referencia citada na questão enquadra-se na bibliografia “BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria n.º 344, de 12 de maio de 1998, suas complementações e atualizações.” Presente no edital	Indeferido	Gabarito mantido
30	Conforme consta no livro BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.13 ed. 2018, página 333, a bupirona está classificada como um fármaco ansiolítico e no trecho “A bupirona, assim como os ISRS, é eficaz após o tratamento crônico.” A referência está sendo no uso dos antidepressivos para o tratamento da ansiedade e não o inverso. No mesmo parágrafo ainda consta “Atua, pelo menos em parte, por meio do sistema serotoninérgico, onde é um agonista parcial nos receptores 5-HT1A. A bupirona também tem efeitos antagonísticos nos receptores D2 de DA, mas a relação entre esse efeito e suas ações clínicas é incerta.” Não é porque um fármaco é agonista parcial dos receptores de serotonina que ele irá gerar as alterações citadas no enunciado da questão, que são alterações características dos antidepressivos, no qual a bupirona não se enquadra.	Indeferido	Gabarito mantido
31	A pergunta da questão está clara: “Qual dos fármacos abaixo pode desencadear a síndrome de abstinência em pacientes dependentes a heroína?”, ou seja, qual dos fármacos que se administrado ao paciente dependente de heroína irá lhe causar sintomas da síndrome de abstinência. A resposta correta é o antagonista de receptores de opióide, naloxona, pois a heroína atua como agonistas destes receptores.	Indeferido	Gabarito mantido
34	Conforme consta no livro BRUTON, L.L.; LAZO, J.S.; PARKER, K.L. Goodman & Gilman. As Bases Farmacológicas da Terapêutica.13 ed. 2018, página 639 - “A hidralazina (1-hidrazinoftalazina) foi um dos	Indeferido	Gabarito mantido

	<p>primeiros anti-hipertensivos ativos por via oral comercializados nos Estados Unidos, porém, no início, raramente era utilizado, devido à ocorrência de taquicardia e taquifilaxia.” Dentre as alternativas presentes na questão o único fármaco que controla a taquicardia, efeito adverso característicos e importante dos vasodilatores como a hidralazina, é o carvedilol devido ao bloqueio de receptor beta 1.</p>		
--	--	--	--