

## CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020

### RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR

- Disciplina  Língua Portuguesa  
 Sistema Único de Saúde (SUS)  
 Conhecimento Específico

Emprego: MÉDICO (Programa Médico de Família)

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
11	II, III e V.	O argumento do recurso se pauta em afirmar que a questão corresponde a prova para Médico Pediatra, não sendo específica a médicos do NASF	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra D</b>
16	Ciclo-oxigenase.	O mecanismo fundamental de ação é o da inibição da ciclo-oxigenase	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra B</b>
17	Idade, excesso de peso e ingestão de sal.	Gênero e raça não se constituem nos fatores de maior impacto na hipertensão arterial	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra C</b>
18	Idade > 60 anos, oximetria < 90%, pressão arterial sistólica < 100 mmHg, ureia > 50 mg/dl.	A única opção que atende ao comando da questão está na opção B.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra B</b>
20	Doença renal crônica.	No hipotireoidismo o mais comum é a presença de macrocitose. Portanto, a única alternativa que atende ao enunciado da questão é Doença renal crônica.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra E</b>
22	Cefepime.	O esquema universal para a neutropenia febril é o Cefepime. Ver. Harrison, Medicina Interna, cap.104	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra A</b>

23	Prescrever apixabana.	Em pacientes com alto risco tromboembólico e fibrilação atrial paroxística a decisão de anticoagular independe do ritmo manter-se sinusal ou não. Pelo perfil de segurança os novos anticoagulantes orais são a primeira escolha. Além disso o enunciado da questão se refere a conduta mais apropriada. Ver Harrison, Medicina Interna, cap 276.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>
25	Enalapril.	A nefropatia diabética com proteinúria indica o uso de enalapril. Ver. Harrison, Medicina Interna, cap 419.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra B</b>
28	Pregabalina.	O perfil de segurança da pregabalina faz dela a primeira escolha no paciente com dor neuropática crônica. Ver harrison, medicina interna, cap. 459 (dor neuropática).	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra A</b>
29	Em jovens sem sinais de alarme, deve-se pesquisar o H. Pylori, de modo não invasivo, e realizar o tratamento, se der positivo.	A opção que melhor atende ao enunciado da questão é a letra C. Ver Harrison, Medicina Interna, figura 348-12, cap 348.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>
32	Diabetes mellitus gestacional.	Em caso da gestante apresentar na primeira consulta de pré-natal, critérios de diagnóstico iguais àqueles predeterminados para o diagnóstico de diabetes fora da gestação (HbA1c) $\geq 6,5\%$ ; glicemia de jejum $\geq 126$ mg/dL; ou glicemia ocasional $\geq 200$ mg/dL], será considerada como portadora de DM. Definiu-se ainda que o diagnóstico do DMG pode ser firmado quando glicemia de jejum for $\geq 92$ mg/dL e $\leq 125$ mg/dL; ou pelo menos um dos valores do TOTG com 75 g, realizado entre 24 e 28 sem. de idade gestacional, for $\geq a 92$ mg/dL no jejum, $\geq a 180$ mg/dL na primeira hora e $\geq a 153$ mg/dL na segunda hora. A gestante do caso na 2ª hora glicemia de 155 mg	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra D</b>
33	Hidratação venosa rápida e ficar em observação	A recomendação do ministério da Saúde para tratamento da dengue está na opção C.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>
37	Gestantes.	A opção C atende as recomendações de terapia do hipotireoidismo subclínico. Ver Harrison medicina Interna, cap 405.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>

40	Pulsoterapia com corticoide.	Na presença de nefrite lúpica com perda da função renal a indicação é de pulsoterapia com corticóide. Ver Harrison, medicina Interna, cap. 378	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra E</b>
41	II, III, IV e V.	Candidato não observou que o item I foi excluído das afirmativas verdadeiras justamente pelos motivos que apontou “ o esquema preconizado não inclui etambutol” como quarto fármaco como afirma a assertiva	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra D</b>
42	A investigação laboratorial de zika se dá por meio do RT-PCR de amostras de pacientes que apresentem exantema maculopapular pruriginoso, acompanhado de dois ou mais dos seguintes sinais e sintomas: febre ou hiperemia conjuntival sem secreção e sem prurido ou poliartralgia ou edema periarticular.	Candidato buscou estender o conteúdo da resposta, trazendo outros elementos para questão (período apropriado para coleta do RT-PCR) como forma de invalidá-la. As assertivas e a resposta apontada como correta NÃO tem qualquer inadequação	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra A</b>
43	Administrar 100 mg de doxiciclina duas vezes ao dia, por sete dias, e azitromicina VO, dose única.	O caso descrito revela quadro em paciente de uretrite persistente. O insucesso terapêutico pode não só se tratar de RESISTÊNCIA BACTERIANA, TRATAMENTO INADEQUADO, REINFECÇÃO ou NÃO ADESÃO, validando a resposta C, como <b>descartada a situação anterior</b> a pesquisa de outros agentes (Tricomonas e Mycoplasma genitalium) deve ser empreendida. Desta a letra C está correta e a letra D também estaria correta.	<b>Deferido</b>	<b>Anulada</b>
44	I, II, III e IV.	Os medicamentos para o tratamento da asma podem ser divididos em medicamentos controladores e medicamentos de alívio ou resgate. Os controladores são a base do tratamento da asma persistente e possuem atividade anti-inflamatória. Além do corticoide inalatório (CI), os corticoides orais (CO), os beta 2-agonistas de longa duração (LABA), e o imunobiológico anti IgE também são considerados medicamentos controladores. Os medicamentos de alívio são aqueles usados de acordo com a necessidade do paciente, atuando rapidamente no alívio dos sintomas e na reversão da broncoconstrição, sendo os beta 2-agonistas inalatórios de curta duração de escolha neste caso e frente ao quadro apresentado pela criança no momento descrito.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra B</b>

45	fibrato; manter PAS < 140 mmHg e PAD < 90 mmHg e HbA1c < 6,0 %.	Levando em conta a bibliografia sugerida para o concurso – Tratado de Medicina de Família e Comunidade – Gustavo Gusso e cols. a resposta mais adequada é a letra C	<b>Deferido</b>	<b>Alterada de E para C</b>
47	A febre amarela silvestre é uma zoonose e sua transmissão não é passível de eliminação, necessitando de vigilância e manutenção das ações de controle (especialmente por meio de cobertura vacinal adequada).	A resposta D pode ser considerada, embora a letra C seja mais completa	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>
48	Limpeza com álcool a 70% e antibioticoterapia por via oral.	Embora a letra E esteja correta a internação hospitalar pode ser necessária já que se trata de neonato	<b>Deferido</b>	<b>Alterada de E para B</b>
50	Devem ser excluídos da oferta da PrEP indivíduos com infecção por HIV, com sinais e sintomas sugestivos de infecção aguda, histórico de fraturas ósseas patológicas não relacionadas a trauma e depuração da creatina ≤ 60 mL/min.	A questão D esta correta as demais opções estão incorretas	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra D</b>