

**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020**

**RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR**

- Disciplina  Língua Portuguesa  
 Sistema Único de Saúde (SUS)  
 Conhecimento Específico

Emprego: **MEDICO PSQUIATRA (Rede de Atenção Psicossocial)**

Nº da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
21	O indivíduo que goza de boa saúde raramente apresenta DT durante a abstinência de álcool.	" Episódios de DTs costumam ter início na faixa dos 30 aos 40 anos de idade, após 5 a 15 anos de consumo intenso, geralmente do tipo compulsivo. Uma doença física (p. ex., hepatite ou pancreatite) predispõe à síndrome; um indivíduo que goza de boa saúde raramente tem DTs durante a abstinência de álcool."  Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica (Página 631). . Edição do Kindle.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra A</b>
24	Cefaleia.	" A bupiriona não causa ganho de peso, disfunção sexual, sintomas de descontinuação ou perturbação significativa do sono. Também não produz sedação ou prejuízo cognitivo ou psicomotor. Seus efeitos adversos mais comuns são cefaleia, náusea, tontura e (raramente) insônia."  Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica (Página 956). . Edição do Kindle.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra B</b>
26	Clonazepam.	A questão solicita que o candidato responda qual dentre os benzodiazepínicos tem melhor resposta. " O clonazepam provou ser um tratamento eficaz para fobia social. Além disso, vários outros benzodiazepínicos (p. ex., diazepam) foram usados como medicamentos adjuntos para esse tratamento."	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra A</b>

		Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica (Página 950). . Edição do Kindle.		
27	Sonolência.	"O efeito adverso mais comum dos benzodiazepínicos é sonolência, que ocorre em cerca de 10% de todas as pessoas. Devido a esse efeito, deve-se alertar o paciente a tomar cuidado ao dirigir ou ao operar maquinário..."  Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica (Página 951). . Edição do Kindle.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na letra C</b>
31	bromocriptina.	" A bromocriptina é um agonista dopaminérgico D2."  Cordioli, Aristides Volpato; Gallois, Carolina Benedetto; Isolan, Luciano. Psicofármacos: Consulta rápida (Locais do Kindle 3447-3448). Artmed. Edição do Kindle.  O Aripiprazol é considerado o protótipo da terceira geração de Antipsicóticos (AP) os chamados estabilizadores do sistema dopamina-serotonina. Seu efeito AP ocorreria pelo agonismo parcial dos receptores dopaminérgicos e serotoninérgicos 5-HT1A, além do antagonismo dos receptores 5-HT2.2 Apresenta-se também como um antagonista dos receptores D2 em áreas de altos níveis de dopamina, como a via mesolímbica.  Cordioli, Aristides Volpato; Gallois, Carolina Benedetto; Isolan, Luciano. Psicofármacos: Consulta rápida (Locais do Kindle 2616-2621). Artmed. Edição do Kindle.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra C</b>
38	Anorexia nervosa.	Anorexia nervosa. Transtorno alimentar caracterizado por perda de peso corporal e recusa a comer. O apetite geralmente é normal.  Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica (Página 295). . Edição do Kindle.	<b>Indeferido</b>	<b>Gabarito mantido na Letra E</b>