



**UFF - UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE**  
**COSEAC - COORDENAÇÃO DE SELEÇÃO ACADÊMICA**  
**FeSaúde - FUNDAÇÃO ESTATAL DE SAÚDE / NITERÓI**  
**CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO**  
**QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO**  
**EDITAL Nº 1/2020**



Leia atentamente todas as informações da Capa do Caderno de Questões antes de começar a Prova

**Emprego: CIRURGIÃO-DENTISTA**  
**Consultório na Rua**

**NÍVEL:**  
**SUPERIOR**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**Instruções ao candidato**

(Parte integrante do Edital – subitem 11.2)

- Ao receber este **Caderno de Questões**, confira se o emprego indicado é aquele para o qual você está concorrendo, se não for notifique imediatamente ao Fiscal. Você será responsável pelas consequências se fizer a Prova para um emprego diferente daquele a que concorre.
- Além deste **Caderno de Questões**, você deverá ter recebido o **Cartão de Respostas**.
- Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, **50 questões de múltipla escolha** e espaços para rascunho. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Confira seus dados com os que aparecem no **Cartão de Respostas**. Se eles estiverem corretos, assine o **Cartão de Respostas** e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao Fiscal.
- Em hipótese alguma haverá substituição do **Caderno de Questões** ou do **Cartão de Respostas** se você cometer erros ou rasuras durante a prova.
- Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido fazer uso de instrumentos auxiliares para cálculos ou desenhos, ou portar qualquer material que sirva de consulta ou comunicação.
- Cada questão objetiva apresenta cinco opções de respostas, sendo apenas uma delas a correta. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da Prova que contiver mais de uma ou nenhuma opção assinalada, emenda ou rasura.
- O tempo disponível para você fazer esta Prova, incluindo o preenchimento do **Cartão de Respostas** é, no mínimo, de **uma hora e trinta minutos** e, no máximo, de **quatro horas**.
- Use somente caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para preencher o **Cartão de Respostas**. Não é permitido uso de lápis mesmo que para rascunho.
- Terminando a prova, entregue ao Fiscal o **Cartão de Respostas** assinado e com a frase abaixo transcrita, a não entrega implicará a sua eliminação no Concurso.
- Somente será permitido **na última hora** que antecede ao término da Prova levar o **Caderno de Questões**.

**FRASE A SER TRANSCRITA PARA O CARTÃO DE RESPOSTAS**  
**NO QUADRO “EXAME GRAFOTÉCNICO”**

**A felicidade e a saúde são incompatíveis com a ociosidade.**

**Aristóteles**



## **Tópico: Sistema Único de Saúde – SUS**

**01** Compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde (SUS):

- (A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde.
- (B) Coordenar os sistemas de vigilância epidemiológica.
- (C) Elaborar normas para regular as relações entre o Sistema Único de Saúde (SUS) e os serviços privados contratados de assistência à saúde.
- (D) Definir os sistemas de vigilância sanitária.
- (E) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano.

**02** O acordo de colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à saúde será firmado por meio de:

- (A) Decreto do Chefe do Poder Executivo Federal.
- (B) Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde.
- (C) Portaria do Ministério da Saúde.
- (D) Convênio entre os entes da federação interessados.
- (E) Consórcio entre União, Estados e Municípios.

**03** São diretrizes do Sistema Único de Saúde e da Rede de Atenção à Saúde a serem operacionalizadas na Atenção Básica:

- (A) Universalidade e equidade.
- (B) Resolutividade e integralidade.
- (C) Territorialização e população adstrita.
- (D) Equidade e participação da comunidade.
- (E) Universalidade e integralidade.

**04** Analise as afirmações abaixo sobre as Regiões de Saúde previstas no Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011.

- I As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais pactuadas na Comissão Intergestores Bipartite – BIT.
- II Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos respectivos Estados em articulação com os Municípios.

III A instituição de Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros países deverá respeitar as normas que regem as relações internacionais.

IV Para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção psicossocial.

Estão corretas:

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I, II e III.
- (C) Somente II e III.
- (D) Somente II, III e IV.
- (E) Somente III e IV.

**05** A descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os investimentos e o desempenho aferido, a partir dos indicadores de saúde do sistema, define:

- (A) O mapa de saúde.
- (B) A porta de entrada.
- (C) A rede de atenção à saúde.
- (D) Os serviços especiais de espaço aberto.
- (E) A região de atenção psicossocial.

**06** Nos termos de que dispõe a Constituição Federal de 1988, é correto afirmar que:

I A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem à eliminação completa do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

II A destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos só é permitida desde que autorizada pelo chefe do poder executivo e aprovada pelo congresso nacional.

III Ao Sistema Único de Saúde compete participar do controle e da fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos.

IV São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente por

instituições públicas, sendo vedada a realização por terceiros ou por pessoa jurídica de direito privado com fins lucrativos, salvo nos casos com expressa previsão legal.

- V É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no país, salvo nos casos previstos em lei.

Estão corretas somente:

- (A) I e II.
- (B) I, II, III e IV.
- (C) II, III, IV e V.
- (D) II, IV e V.
- (E) III e V.

**07** Com relação ao que dispõe a Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou empregos poderão exercer suas atividades em mais de um estabelecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (B) Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e por entidades representativas da sociedade civil.
- (C) Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), só poderão ser exercidos em regime de tempo integral.
- (D) A participação complementar dos serviços privados será formalizada mediante contrato ou convênio, observadas, a respeito, as normas de direito privado.
- (E) Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.

**08** Não constituirão despesas com ações e serviços públicos de saúde, para fins de apuração dos percentuais mínimos de que trata a Lei Complementar nº 141, de 13 de Janeiro de 2012, aquelas decorrentes de:

- (A) Pessoal ativo da área de saúde quando em atividade alheia à referida área.
- (B) Gestão do sistema público de saúde e de operação de unidades prestadoras de serviços públicos de saúde.
- (C) Capacitação do pessoal de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS).
- (D) Desenvolvimento científico e tecnológico e controle de qualidade promovidos por instituições do SUS.
- (E) Manejo ambiental vinculado diretamente ao controle de vetores de doenças.

**09** De acordo com a Lei nº 8142, de 1990, os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como:

- I Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da administração direta e indireta.
- II Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso Nacional.
- III Investimentos previstos no Plano Bienal do Ministério da Saúde.
- IV Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e Distrito Federal.

Dos itens acima estão corretas somente:

- (A) I e II.
- (B) I, II e III.
- (C) I, II e IV.
- (D) II, III e IV.
- (E) III e IV.

**10** Assinale a opção em desacordo com a Portaria nº 2.436, de 21 de setembro de 2017.

- (A) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito do SUS, de acordo com essa portaria, serão denominados Unidade Básica de Saúde.
- (B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação física, intelectual, funcional e outras.
- (C) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à saúde, e visa a estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e os danos à saúde, na perspectiva da intra e intersectorialidade.
- (D) A Política Nacional de Atenção Básica considera os termos Atenção Básica (AB) e Atenção Primária à Saúde (APS), nas atuais concepções, como termos diferentes, sendo as diretrizes previstas nessa portaria aplicáveis integralmente somente à AB.
- (E) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e o centro de comunicação da RAS, coordenadora do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede.

### **Tópico: Conhecimentos Específicos**

**11** A composição da solução encontrada no tubete **anestésico** odontológico varia de acordo com a inclusão ou não de um vasoconstrictor. Os tubetes que contêm vasoconstrictor também contêm um antioxidante, mais frequentemente a(o):

- (A) Glutationa.
- (B) Alfatocoferol.
- (C) Metilparabeno.
- (D) Bissulfito de sódio.
- (E) Peróxido dismutase.

**12** Assinale, entre as lesões pré-cancerosas da mucosa oral abaixo relacionadas, aquela com maior potencial de transformação maligna.

- (A) Quelite angular.
- (B) Eritroplasia.
- (C) Queilose actínica.
- (D) Ceratose do tabaco sem fumaça.
- (E) Forma erosiva do líquen plano.

**13** Em relação aos granulomas piogênicos orais, é correto afirmar que:

- (A) São mais comuns na face vestibular da gengiva do que na face lingual.
- (B) Mostram uma pequena predileção pela gengiva e representam apenas vinte por cento dos casos.
- (C) É muito rara história de trauma antes do desenvolvimento da lesão, especialmente em casos de acometimento extragengival.
- (D) São mais comuns na gengiva inferior, sendo as áreas posteriores mais afetadas que as anteriores.
- (E) São mais comuns entre a quarta e quinta décadas de vida, embora possam se desenvolver em qualquer faixa etária.

**14** Analise as afirmações abaixo sobre a pulpite.

- I Quando expostos a temperaturas extremas, os dentes com pulpite reversível (PR) comumente apresentam dor súbita de grande intensidade e com longa duração.
- II Nos estágios iniciais da pulpite irreversível (PI), em geral, ocorre dor aguda e acentuada ao estímulo térmico que cessa, em regra, depois da remoção do estímulo.
- III Na PR, a dor não ocorre na ausência de estímulos e regride dentro de alguns segundos, após a remoção dos mesmos.
- IV Nos estágios iniciais da PI, a dor pode ser facilmente relacionada ao dente afetado.

A opção correta é:

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I, II e III.
- (C) Somente I e IV.
- (D) Somente II, III e IV.
- (E) Somente III e IV.

15 Um defeito do esmalte encontrado em dentes permanentes é causado por doença inflamatória periapical dos dentes decíduos sobrejacentes. Tal alteração é chamada de dente de:

- (A) Turner.
- (B) Hutchinson.
- (C) Veneers.
- (D) Capdepont.
- (E) Fournier.

16 A papila retrocanina é uma lesão de desenvolvimento localizada na região:

- (A) Palatina de caninos permanentes superiores.
- (B) Vestibular de caninos permanentes superiores.
- (C) Lingual de caninos mandibulares.
- (D) Vestibular de molares decíduos inferiores.
- (E) Palatina de molares decíduos superiores.

17 Assinale o fator que dificulta a cirurgia de dente impactado.

- (A) Osso elástico.
- (B) Impactação por tecido mole.
- (C) Folículo amplo.
- (D) Ligamento periodontal amplo.
- (E) Raízes divergentes e curvas.

18 Indique a droga mais importante e de uso imediato no tratamento de reação anafilática, com sinais de envolvimento do trato respiratório inferior.

- (A) Corticosteroide.
- (B) Adrenalina.
- (C) Anti-inflamatório.
- (D) Analgésico opioide.
- (E) Broncodilatador.

19 As penas disciplinares aplicáveis pelos Conselhos Regionais aos cirurgiões-dentistas inscritos são as seguintes, **EXCETO**:

- (A) Advertência confidencial, em aviso reservado.
- (B) Censura confidencial, em aviso reservado.
- (C) Suspensão do exercício profissional por até 60 dias.
- (D) Censura pública, em publicação oficial.
- (E) Cassação do exercício profissional, *ad referendum* do Conselho Federal.

20 Assinale, entre as opções abaixo relacionadas, a impactação que é reconhecida como a menos difícil de se remover.

- (A) Vertical.
- (B) Distoangular.
- (C) Horizontal.
- (D) Mesioangular.
- (E) Inclinação mesial acentuada.

21 A erupção continua depois do aparecimento do dente para compensar o desgaste mastigatório e o crescimento dos ossos gnáticos. A interrupção da erupção depois do seu começo, devido à fusão da dentina com o osso alveolar, é conhecida como:

- (A) Impacção.
- (B) Anquilose.
- (C) Abfração.
- (D) Atrição.
- (E) Amelogênese imperfeita.

22 Os dentes pré-molares e a raiz mesiovestibular dos primeiros molares superiores têm inervação sensitiva suprida pelo nervo:

- (A) Alveolar superior anterior.
- (B) Palatino anterior.
- (C) Alveolar superior médio.
- (D) Nasopalatino.
- (E) Alveolar superior posterior.

23 Analise as afirmativas abaixo sobre o alvéolo seco (AS).

- I A detecção de um AS pode ser dificultada pela retenção parcial do coágulo.
- II O diagnóstico é confirmado pela sondagem do alvéolo, que revela um osso exposto e sem sensibilidade.
- III Em geral, desenvolvem-se odor fétido, tumefação e linfadenopatia três a quatro dias depois da extração do dente.
- IV Frequentemente o trismo é observado.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I e III.
- (C) Somente III e IV.
- (D) Somente II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**24** Assinale a patologia perirradicular mais comumente encontrada.

- (A) Granuloma.
- (B) Abscesso agudo.
- (C) Cisto dermoide.
- (D) Abscesso crônico.
- (E) Cisto de retenção.

**25** Preencha o espaço com a opção correta.

O \_\_\_\_\_ consiste em uma massa conglomerada de esmalte e dentina que **NÃO** exibe semelhança anatômica com um dente.

- (A) Fibrodontoma.
- (B) Odontoblastoma.
- (C) Fibroma ameloblástico.
- (D) Odontoma complexo.
- (E) Tumor de Pindborg.

**26** O aumento do corpo e da câmara pulpar de um dente multirradicular, com deslocamento apical do soalho pulpar e da bifurcação das raízes, é chamado de:

- (A) Geminação.
- (B) Hipercementose.
- (C) Dente invaginado.
- (D) Taurodontia.
- (E) Concrecência.

**27** A anemia megaloblástica é uma condição clínica que causa a deficiência de vitamina:

- (A) B1.
- (B) B2.
- (C) B3.
- (D) B6.
- (E) B12.

**28** Classicamente, a doença de Riga-Fede acomete:

- (A) Homens idosos.
- (B) Mulheres grávidas.
- (C) Bebês entre uma semana e um ano de idade.
- (D) Adolescentes, principalmente do sexo feminino.
- (E) Pré-escolares de ambos os sexos.

**29** São características radiológicas associadas ao ameloblastoma:

- (A) Reabsorção radicular, versões e deslocamento de dentes vizinhos.
- (B) Radioluscência unilocular bem definida associada com dentes não erupcionados.
- (C) Margens escleróticas distintas e múltiplos focos radiopacos dentro da radioluscência.
- (D) Radioluscência multilocular em “bolha de sabão”.
- (E) Radioluscência multilocular com aparência de “raquete de tênis”.

**30** Indique a opção que preenche corretamente o espaço abaixo.

Por definição o \_\_\_\_\_ se origina pela separação do folículo que fica ao redor da coroa de um dente incluso.

- (A) Cisto de erupção.
- (B) Cisto dentígeno.
- (C) Ceratocisto.
- (D) Cisto periodontal lateral.
- (E) Ceratocisto odontogênico calcificante.

**31** Assinale a condição patológica que se caracteriza radiologicamente pela presença de radiopacidade com margens bem definidas.

- (A) Cisto palatino mediano.
- (B) Cisto periapical residual.
- (C) Raiz residual retida.
- (D) Folículo dentário hiperplásico.
- (E) Germe dentário em desenvolvimento.

**32** Os ductos de Rivinus emergem da(s) glândula(s):

- (A) Parótida.
- (B) Parótida e menor.
- (C) Submandibular.
- (D) Salivar menor.
- (E) Sublingual.

**33** Assinale o instrumento **INADEQUADO** para a remoção do tórus mandibular.

- (A) Broca.
- (B) Martelo.
- (C) Cinzel.
- (D) Periótomo.
- (E) Osteótomo.

**34** O exame radiográfico pode se inserir em qualquer momento do processo diagnóstico. Constitui-se um elemento imprescindível ao planejamento do tratamento endodôntico a incidência da:

- (A) Oclusal.
- (B) Periapical.
- (C) Interproximal.
- (D) Linha de Camper paralela ao chão.
- (E) Panorâmica.

**35** Em virtude de seu espectro de atividade antibacteriana e de sua excelente penetração no tecido ósseo, um dos antimicrobianos abaixo relacionados tem sido considerado o medicamento eleito para o tratamento de infecções endodônticas em pacientes alérgicos às penicilinas ou resistentes a esses fármacos. Assinale-o.

- (A) Tetraciclina.
- (B) Azitromicina.
- (C) Clindamicina.
- (D) Cefalotina.
- (E) Cefalexina.

**36** Em relação às pastas à base de hidróxido de cálcio, analise as afirmativas abaixo.

- I São empregadas como material obturador provisório de canais radiculares, depois do seu preparo químico mecânico.
- II São indicadas como medicação intracanal com polpa viva.
- III Estão contraindicadas como medicação intracanal com polpa necrosada e em casos de rizogênese incompleta.
- IV A atividade antibacteriana do hidróxido de cálcio está relacionada à liberação do íon hidroxila, oriundo de sua dissociação em ambiente aquoso.

Estão corretas as afirmativas:

- (A) Somente I e II.
- (B) Somente I, II e III.
- (C) Somente I, II e IV.
- (D) Somente III e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**37** A perda de estrutura dentária devido a um estresse oclusal, que, por flexão repetida, provoca falha no esmalte e na dentina distante do ponto de pressão, corresponde ao conceito de:

- (A) Atrição.
- (B) Erosão.
- (C) Demastigação.
- (D) Abfração.
- (E) Reabsorção interna.

**38** Constitui infração ética do cirurgião-dentista:

- (A) Iniciar qualquer procedimento ou tratamento odontológico sem o consentimento prévio do paciente ou do seu responsável legal, em caso de urgência ou emergência.
- (B) Delegar a profissionais técnicos ou auxiliares atos ou atribuições não exclusivas da profissão de cirurgião-dentista.
- (C) Executar procedimentos como técnico em prótese dentária, técnico em saúde bucal, auxiliar em saúde bucal e auxiliar em prótese dentária, dentro daqueles discriminados na lei que regulamenta a profissão e nas resoluções do Conselho Federal.
- (D) Deixar de atender paciente que procura cuidado profissional em caso de urgência, mesmo quando haja outro cirurgião-dentista em condições de fazê-lo.
- (E) Revelar, sem justa causa, fato sigiloso de que tenha conhecimento em razão do exercício de sua profissão.

**39** Assinale a condição cardiovascular caracterizada como de alto risco para o desenvolvimento de endocardite bacteriana em que profilaxia antibiótica está recomendada.

- (A) Válvula cardíaca protética.
- (B) Prolapso de válvula mitral com ou sem regurgitação.
- (C) Febre reumática prévia.
- (D) Presença de *ductus arteriosus*.
- (E) Reparo cirúrgico de defeito do septo atrial.



**40** Quando se executa uma intervenção dentária que produzirá sangramento da mucosa, a profilaxia da endocardite bacteriana para a maioria das condições de rotina, quando indicada, pode ser obtida com a administração de dois gramas de amoxicilina:

- (A) No início da intervenção.
- (B) Duas horas depois da intervenção.
- (C) Quatro horas antes da intervenção.
- (D) Uma hora antes da intervenção.
- (E) Seis horas antes da intervenção.

**41** Uma forte associação com hiperplasia gengival tem sido observada em pacientes que fazem uso concomitante de:

- (A) Anlodipino e ibuprofeno.
- (B) Primidona e bepridil.
- (C) Diltiazem e verapamil.
- (D) Fenitoína e nifedipina.
- (E) Amoxicilina e ácido acetilsalicílico.

**42** O deslocamento traumático parcial do dente para fora do seu alvéolo é característico da:

- (A) Intrusão.
- (B) Extrusão.
- (C) Luxação lateral.
- (D) Avulsão.
- (E) Fratura incompleta do processo alveolar.

**43** Na concussão, ocorre lesão de suporte do dente:

- (A) Com sensibilidade ao toque ou percussão com mobilidade sem luxação.
- (B) Sem sensibilidade ao toque ou percussão, com mobilidade ou luxação lateral.
- (C) Com sensibilidade ao toque ou percussão, com mobilidade em direção mesial quase sempre com luxação.
- (D) Sem sensibilidade ao toque ou percussão, com deslocamento em direção lingual, normalmente em um espaço de dente perdido.
- (E) Com sensibilidade ao toque ou percussão, sem mobilidade ou luxação.

**44** Em relação aos abscessos periapicais (AP), pode-se afirmar que:

- I Nos estágios iniciais provocam sensibilidade no dente afetado, que é, muitas vezes, aliviada com a aplicação de pressão.
- II O dente afetado responde intensamente ao frio e aos testes pulpares elétricos.
- III O desgaste oclusal é recomendado, se o dente acometido estiver destruído, pois o trauma oclusal crônico tem sido relacionado ao atraso na resolução do processo inflamatório.
- IV O uso de antibióticos é obrigatório, em particular, para os pacientes com AP bem localizados e de fácil drenagem.

Estão corretas somente:

- (A) I e II.
- (B) I e III.
- (C) I e IV.
- (D) II e IV.
- (E) III e IV.

**45** O hipoclorito de sódio (NaOCl) pode ser diluído obtendo-se soluções cloradas com diferentes concentrações usadas na endodontia. O líquido de Dakin é uma solução de NaOCl a:

- (A) 0,5%.
- (B) 1,5%.
- (C) 2,5%.
- (D) 4,0%.
- (E) 5,0%.

**46** Assinale o bacilo Gram-negativo anaeróbio estrito, que é uma das espécies mais frequentemente encontradas em canais radiculares infectados, associados a lesões crônicas e abscessos.

- (A) *Bacteroides fragilis*.
- (B) *Tannerella forsythia*.
- (C) *Fusobacterium nucleatum*.
- (D) *Peptostreptococcus stomatis*.
- (E) *Pseudoramibacter alactolyticus*.

**47** No procedimento conhecido como biópsia incisional, é realizada a:

- (A) Curetagem da lesão.
- (B) Remoção de toda lesão.
- (C) Simples incisão na lesão com *inprint* em lâmina.
- (D) Remoção de parte representativa de uma lesão.
- (E) Aspiração com agulha de grosso calibre de parte da lesão.

**48** A presença de coroas com coloração cinza-negra com perda da translucidez, geralmente, está relacionada à:

- (A) Necrose pulpar.
- (B) Metamorfose cálcica.
- (C) Eritroblastose fetal.
- (D) Reabsorção interna.
- (E) Dentinogênese imperfeita.

**49** Em relação à periodontite agressiva localizada, pode-se afirmar que:

- (A) Nas regiões dos primeiros molares as radiografias revelam reabsorção óssea vertical quase sempre unilateral.
- (B) Apresenta fraca resposta de anticorpos séricos aos agentes infecciosos.
- (C) A migração e a mobilidade dos dentes são muito raras.
- (D) De todos os patógenos presentes na placa dental o *Bacteroides fragilis* parece ser predominante, estando presente em mais de noventa e cinco por cento dos casos.
- (E) Tipicamente ocorre por volta dos 11 aos 13 anos de idade.

**50** Assinale o anestésico local que apresenta a maior meia-vida.

- (A) Lidocaína.
- (B) Tetracaína.
- (C) Bupivacaína.
- (D) Ropivacaína.
- (E) Mepivacaína.

