

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE EMPREGOS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA FUNDAÇÃO FeSAÚDE – Edital 01/2020

RESPOSTAS AOS RECURSOS – NÍVEL SUPERIOR

Disciplina

- Língua Portuguesa
- Sistema Único de Saúde (SUS)
- Conhecimento Específico

Emprego: Farmacêutico_ Rede de Atenção Psicossocial

42	Um agravamento do quadro de diabetes por falta de adesão ao tratamento relacionado ao quadro depressivo.	<p>A referência “Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Página 94”, apresenta dados da literatura sobre a associação entre problemas de saúde mental e outros agravos à saúde, destaca-se a associação entre depressão e piora na adesão ao tratamento da diabetes como sendo confirmada de maneira consistente na literatura.</p> <p>Também de acordo com as orientações desta referência do Ministério da Saúde “<i>É de suma importância lembrar que ao acolher uma pessoa em situação limite deve-se ter em mente que a crise não deve ser compreendida como condição pessoal, localizada no interior da pessoa que a manifesta, mas ela é produzida nas relações e contextos de vida do usuário. É fundamental a compreensão da crise como um fenômeno constituído entre os sujeitos, costumeiramente em cenários de conflitos exacerbados, ruptura de consensos, esgarçamento das relações e busca ineficaz de comunicação.</i></p> <p><i>Diante disto, a intervenção terapêutica deve dirigir-se não somente para o usuário, mas também para a produção de consensos possíveis entre as partes envolvidas, a partir do reconhecimento de interesses singulares. O profissional deve investir na mediação entre o usuário e seu conjunto de relações, visando à inclusão, à legitimação e à responsabilização dos envolvidos na produção de novas pactuações, ainda que provisórias. Reinstaurar o diálogo, coloca-se</i></p>	Indeferido	LETRA D
----	--	--	-------------------	---------

		<i>simultaneamente como objetivo e ação terapêutica.</i> Neste sentido, um atendimento individual desconsidera uma série de dimensões que podem estar envolvidas com o quadro apresentado no enunciado da questão.		
43	Considerar o risco aumentado para saúde mental pela morte de membro da família e recomendar envolvimento positivo na família.	<p>A questão destaca o papel do farmacêutico como parte da equipe de saúde, esse profissional deverá agir considerando fatores de risco e de proteção selecionados para saúde mental de crianças e adolescentes, conforme destaca a referência Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Página 107.</p> <p>Destaca-se que no enunciado da questão não foi reportado qualquer problema de saúde para J.B.B assim, recomendar o uso de medicamentos seria ultrapassar uma fronteira legal que não permite ao farmacêutico prescrever todos os medicamentos, e ainda pode ser entendido como um equívoco que contribuiria para o que é reconhecido como medicalização da saúde.</p>	Indeferido	LETRA A
44	Escutar o usuário e acolher suas queixas emocionais como legítimas.	<p>A questão contextualiza o cuidado em saúde mental na atenção primária e práticas a serem realizadas por todos os trabalhadores de saúde neste nível de atenção, neste sentido as opções A, B, C e D tratam de ações relacionadas ao medicamento, que não necessariamente estão vinculadas ao cuidado em saúde mental. A opção E apresenta uma prática de cuidado comum a todos os trabalhadores da atenção primária no cuidado em saúde mental, inclusive farmacêuticos.</p> <p>A resposta encontra respaldo na referência Saúde, Departamento de Atenção Básica, Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. – Brasília: Ministério da Saúde, 2013. 176 p. : il. (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Página 23.</p>	Indeferido	LETRA E
47	A risperidona é uma boa alternativa de tratamento, pois os efeitos anticolinérgicos são mínimos, o que poderia agravar a crise.	Conforme a referência de Brunton, L. L.; Hilal-Dandan, R.; Knollmann, B. C. As bases farmacológicas da terapêutica de Goodman & Gilman. 13ª ed. Porto Alegre: AMGH, 2019. Pag. 341 “ Como os efeitos dos fármacos anticolinérgicos podem agravar o delirium e a demência, os antipsicóticos típicos de	Indeferido	LETRA D

		alta potência (p. ex. Haloperidol) ou os agentes antipsicóticos atípicos com propriedades anti-muscarínicas limitadas (p. ex. Risperidona) constituem frequentemente os fármacos de escolha. “		
--	--	--	--	--

