

Parte II: Conhecimento Específico

21 O fechamento hermético dos frascos de drenagem torácica e o selo hidráulico constituem meios para a prevenção de:

- (A) hemotórax;
- (B) hidrotórax;
- (C) pneumotórax;
- (D) hemopneumotórax;
- (E) infecção pulmonar.

22 Nas primeiras vinte e quatro horas do puerpério imediato, a Assistência de Enfermagem deve, prioritariamente:

- (A) estimular a deambulação e orientar para amamentação;
- (B) fazer higiene da paciente e trocar absorvente higiênico;
- (C) promover educação para saúde no binômio mãe – filho;
- (D) verificar TPR e PA e observar sangramento;
- (E) registrar os cuidados prestados ao binômio mãe – filho.

23 A aplicação de calor é contra-indicada, nos casos de apendicite, porque:

- (A) acelera o processo de supuração;
- (B) acelera a vaso-constricção;
- (C) acelera o crescimento bacteriano;
- (D) é desconfortável para o paciente;
- (E) dificulta a localização da supuração.

24 Identifique os cuidados de enfermagem que devem ser prestados ao recém-nato submetido à fototerapia:

- (A) verificar altura, sinais vitais e peso, antes e após o tratamento;
- (B) verificar altura e sinais vitais, principalmente a temperatura;
- (C) fazer hidratação e efetuar pesagem com a criança desnuda;
- (D) verificar sinais vitais e fazer hidratação de acordo com o peso;
- (E) proteger a visão, deixar as partes expostas desnudas e hidratar.

25 Na profilaxia da tromboflebite, um dos principais cuidados de enfermagem é:

- (A) manter repouso absoluto;
- (B) estimular a deambulação;
- (C) manter os membros inferiores sem apoio;
- (D) aplicar calor;
- (E) administrar antibióticos.

26 O requisito básico para evitar infecção cruzada é:

- (A) cuidar de um único paciente;
- (B) utilizar desinfetantes;
- (C) administrar antibiótico;
- (D) lavar as mãos;
- (E) tomar banho diariamente.

27 Foram prescritos 1500 mL de soro glicosado a 5% para correr em 24h. Nesse caso, durante quanto tempo deverá ser infundido cada frasco de 500 mL?

- (A) 4 horas;
- (B) 6 horas;
- (C) 8 horas;
- (D) 10 horas;
- (E) 12 horas.

28 A meningite meningocócica é uma infecção bacteriana aguda, caracterizada por:

- (A) febre, cefalalgia intensa, náuseas e vômito;
- (B) constipação intestinal, vômito, febre e dor abdominal;
- (C) dor abdominal, vômito, diarreia e febre;
- (D) epistaxe, febre, náuseas e dor torácica;
- (E) dor na nuca, febre, diarreia e convulsões.

29 Os ângulos apropriados para as injeções intramusculares, subcutâneas e intradérmicas são, respectivamente:

- (A) 45°, 25° e 15°;
- (B) 70°, 50° e 15°.
- (C) 80°, 35° e 15°;
- (D) 90°, 45° e 15°;
- (E) 90°, 60° e 15°;

30 A expulsão pela boca de sangue vivo rutilante e proveniente dos pulmões é chamada:

- (A) petéquia;
- (B) hematúria;
- (C) hemorragia;
- (D) hematêmese;

(E) hemoptise.

31 Que vacina é aplicada à gestante com o objetivo de proteger, no futuro, a puérpera e o recém-nato?

- (A) antidiftérica;
- (B) antipólio;
- (C) antitifoide;
- (D) antitetânica;
- (E) anti-hepatite B.

32 Para que o poder antisséptico do álcool seja eficiente, nos microorganismos, deve-se usá-lo na concentração de:

- (A) 50%.
- (B) 70%;
- (C) 90%;
- (D) 96,2%;
- (E) 100%;

33 A pressão constante de algumas áreas do corpo contra o colchão provoca o aparecimento de:

- (A) cianose;
- (B) edema;
- (C) *pediculus corporis*;
- (D) hematoma;
- (E) úlcera de decúbito.

34 A posição ideal para o clister é a:

- (A) lateral direita;
- (B) de Trendelenburg;
- (C) de Sims;
- (D) de Fowler;
- (E) ginecológica.

35 A hemorragia digestiva, caracterizada por vômito sanguinolento, é denominada:

- (A) hematúria;
- (B) melena;
- (C) hemoptise;
- (D) hematêmese;
- (E) epistaxe.

36 Foram prescritos 1500 mL de soro glicosado a 5% para correr em 24h. Qual o gotejamento a ser seguido?

- (A) 14 gts/min.
- (B) 21 gts/min;
- (C) 28 gts/min;
- (D) 30 gts/min;
- (E) 35 gts/min;

37 A ação de uma equipe de enfermagem que não administra os medicamentos, nos horários prescritos, é considerada um crime denominado:

- (A) imperícia;
- (B) imprudência;
- (C) negligência;
- (D) eutanásia;
- (E) dolo.

38 Considera-se gravidez prolongada, ou pós-matura, aquela com duração:

- (A) superior a 42 semanas contadas a partir do 1º dia da última menstruação;
- (B) superior a 36 semanas contadas a partir do 1º dia da última menstruação;
- (C) superior a 280 dias contados a partir do 1º dia da última menstruação;
- (D) superior a 42 semanas contadas a partir do 5º dia da última menstruação;
- (E) superior a 294 dias contados a partir do 10º dia da última menstruação.

39 Paciente em pós-operatório imediato de histerectomia total chega à RPA com prescrição de 1500 mL de soro Ringer com lactato e 1500 mL de soro glicosado a 5%. O controle do gotejamento deve ser ajustado para as 12 horas seguintes. O técnico de enfermagem, ao dar continuidade à hidratação venosa, deve controlar o número de gotas para:

- (A) 42 gts/min;
- (B) 54 gts/min.
- (C) 65 gts/min;
- (D) 72 gts/min;
- (E) 83 gts/min;

40 A medicação dexametasona injetável é fabricada em frascos de 2,50 mL na concentração de 4 mg/mL. Assim sendo, para administrar uma prescrição de 6 mg, que quantidade da substância deve ser aspirada?

- (A) 0,50 mL;
- (B) 1,00 mL;
- (C) 1,25 mL.
- (D) 1,50 mL;

(E) 2,00 mL;

41 A via de administração da insulina é o tecido subcutâneo, encontrado abaixo do derma e formado por células de gordura. A lipodistrofia insulínica ocorre em consequência de:

- (A) falta de limpeza/asepsia da pele;
- (B) repetidas aplicações no mesmo local;
- (C) existência de bolha de ar na seringa;
- (D) aplicações próximas às articulações;
- (E) inclinação inadequada da agulha.

42 Aplicar um golpe com o punho fechado, no tórax do paciente, é uma manobra emergencial utilizada nos casos de:

- (A) choque hipovolêmico;
- (B) choque cardiogênico;
- (C) síncope respiratória;
- (D) crise convulsiva;
- (E) parada cardíaca.

43 Para perfundir 520 mL de soroterapia, no período das 10 às 18 horas, deve-se instalar um gotejamento, aproximadamente, igual a:

- (A) 25 mL/h;
- (B) 45 mL/h;
- (C) 65 mL/h;
- (D) 75 mL/h.
- (E) 85 mL/h;

44 Um dos sinais característicos de insuficiência respiratória aguda é:

- (A) bradicardia;
- (B) febre;
- (C) tosse;
- (D) cianose;
- (E) hipertensão.

45 Um material indispensável para a realização de intubação endotraqueal é:

- (A) laringoscópio;
- (B) termômetro;
- (C) pinça de Pean;
- (D) cânula de Guedel;
- (E) guia de intubação.

46 Na administração de heparina por via subcutânea, massagear o local, após a injeção, pode trazer ao paciente:

- (A) conforto físico;
- (B) lesão tecidual;
- (C) redução da dor;
- (D) melhor absorção;
- (E) aumento da dor.

47 Aplicações frias são contra-indicadas em caso de:

- (A) dor muscular;
- (B) edema;
- (C) contusões;
- (D) hipertermia;
- (E) estase circulatória.

48 A enfermidade caracterizada pelo aparecimento das manchas de Koplik é chamada:

- (A) hanseníase;
- (B) dengue;
- (C) sarampo;
- (D) difteria;
- (E) meningite.

49 Durante a aspiração da traqueostomia, para limitar os traumas causados ao epitélio, a sonda introduzida na cânula deve aí permanecer, a cada vez, por, no máximo:

- (A) 05 segundos;
- (B) 10 segundos;
- (C) 20 segundos;
- (D) 30 segundos;
- (E) 40 segundos.

50 Um comprimido de digoxina de 0,25 mg foi diluído em 20 mL de água filtrada. Portanto, para se administrar 0,10 mg de digoxina, a quantidade da solução que deve ser aspirada é:

- (A) 04 mL;
- (B) 05 mL;
- (C) 06 mL;
- (D) 07 mL;
- (E) 08 mL.

51 O uso de oxigênio em prematuros deve ser atentamente monitorado porque altas concentrações, por período prolongado, podem causar:

- (A) rinite;
- (B) exoftalmia;
- (C) faringite;
- (D) cegueira;
- (E) otite.

52 O cuidado de enfermagem que precede a administração de digitalico é a aferição de:

- (A) frequência cardíaca;
- (B) incursões respiratórias;
- (C) pressão arterial;
- (D) pressão arterial média;
- (E) pressão do átrio esquerdo.

53 O rodízio sistemático dos locais para aplicação de insulina é necessário a fim de prevenir:

- (A) angioedema;
- (B) lipodistrofia;
- (C) isquemia local;
- (D) hipertrofia muscular;
- (E) reações alérgicas.

54 É finalidade dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem:

- (A) defesa econômica;
- (B) desenvolvimento profissional;
- (C) fiscalização do exercício profissional;
- (D) desenvolvimento cultural;
- (E) desenvolvimento da educação.

55 Foram prescritas 20 mg de garamicina, por via IM, para um pré-escolar. Como no posto de enfermagem só há ampolas de 80 mg em 02 mL, deve-se aspirar, de uma dessas ampolas:

- (A) 0,1 mL;
- (B) 0,25 mL;
- (C) 0,4 mL;
- (D) 0,5 mL;
- (E) 0,8 mL.

56 Os trabalhadores que lidam com sangue e outros fluidos corporais devem ser vacinados contra:

- (A) tuberculose;
- (B) meningite;
- (C) febre amarela;
- (D) difteria;
- (E) hepatite B.

57 Para aplicação de reanimação cardiopulmonar, em que posição se deve colocar a cabeça da vítima?

- (A) inclinada;
- (B) lateralizada para a direita;
- (C) flexionada;
- (D) hiperestendida;
- (E) lateralizada para a esquerda.

58 Identifique o agente etiológico da sífilis:

- (A) *Treponema pallidum*;
- (B) *Trichinella spiralis*;
- (C) *Plasmodium falciparum*;
- (D) *Streptococcus haemolyticus*;
- (E) *Plasmodium vivax*.

59 Quando o socorrista, sozinho, aplica reanimação cardiopulmonar, a alternância da massagem cardíaca externa com a insuflação pulmonar deve ser feita na proporção:

- (A) 5:1
- (B) 5:2
- (C) 10:1
- (D) 10:2
- (E) 15:2

60 O coma diabético se caracteriza pela condição orgânica denominada:

- (A) hiperpotassemia;
- (B) hiperglicemia;
- (C) hipocalcemia;
- (D) hiperlipidemia;
- (E) hipernatremia.