

RESPOSTAS AOS RECURSOS

- Disciplina  Língua Portuguesa  
 Raciocínio Lógico  
 Noções de Informática  
 Conhecimentos Específicos – Cargo: Enfermeiro

N° da Questão	Opção de Resposta por extenso divulgada	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
23	Apenas I e II estão corretas	<p>”Segundo o artigo 52 da resolução COFEN nº 564/2017, é dever do profissional de enfermagem “manter sigilo sobre o fato de que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto nos casos previstos na legislação ou por determinação judicial, ou com o consentimento escrito da pessoa envolvida ou seu representante legal.”</p> <p>O paragrafo 1º ainda do artigo ressalta que “Permanece o dever mesmo quando o fato seja de conhecimento público e em caso de falecimento da pessoa envolvida”</p> <p>Pelo exposto, considera-se que a afirmativa III da questão está incorreta, já que ela declara que: “é dever do profissional manter sigilo sobre fato que tenha conhecimento em razão da atividade profissional, exceto quando o fato seja de conhecimento público(...)”.</p>	INDEFERIDO	
26	A cessação do tabagismo	Segundo a publicação <b>Linhas de cuidado: hipertensão arterial e diabetes</b> , da Organização Pan-Americana da Saúde (bibliografia sugerida em edital) na página 194 há a seguinte afirmação: O	INDEFERIDO	

		<p>risco de morbimortalidade prematura para complicações micro e macrovasculares associado ao fumo é bem documentado. Como recomendação geral, a orientação para abandono do tabagismo com ou sem uso de terapia farmacológica específica deve fazer parte da rotina dos cuidados com pacientes portadores de diabetes.</p> <p>Em publicação do Ministério da Saúde, (Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : diabetes mellitus) também sugerida em edital, na página 34 afirma-se: "Nas consultas de enfermagem o processo educativo deve preconizar a orientação de medidas que comprovadamente melhorem a qualidade de vida: hábitos alimentares saudáveis, estímulo à atividade física regular, redução do consumo de bebidas alcoólicas e abandono do tabagismo".</p> <p>Ressalta-se que na mesma publicação, na página 72 orienta-se que "Todas as pessoas com DM devem ser alertadas quanto à presença dos seguintes fatores de risco para doença macrovascular: tabagismo, dislipidemia, hipertensão, hiperglicemia e obesidade central (SCOTTISH INTERCOLLEGIATE GUIDELINES NETWORK, 2010). Um plano de ação pode ser desenvolvido para dar apoio às pessoas no controle destes fatores de risco. A equipe precisa auxiliar e apoiar as pessoas com DM na suspensão do tabagismo, adoção de uma dieta saudável e realização de atividade física de forma regular"</p> <p>Em outra publicação do Ministério da Saúde ( Manual do pé diabético : estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica), destaca-se: "Evidências científicas mostram que os cuidados</p>		
--	--	---	--	--

		<p>que mais produzem impacto positivo na saúde da pessoa com DM são frequentemente negligenciados (como, por exemplo, a abordagem para cessação do tabagismo e avaliação dos pés); enquanto que a excessiva preocupação de pacientes e profissionais com o controle glicêmico não beneficia o indivíduo tanto quanto os profissionais imaginam (ERLICH et al., 2014).”</p> <p>Bibliografia:  Organização Pan-Americana da Saúde. <b>Linhas de cuidado: hipertensão arterial e diabetes</b>. Brasília: Organização Pan-Americana da Saúde, 2010.  Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. <b>Estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica : diabetes mellitus</b>. Brasília: Ministério da Saúde, 2013.</p> <p>Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. <b>Manual do pé diabético : estratégias para o cuidado da pessoa com doença crônica</b>. Brasília: Ministério da Saúde, 2016</p>		
35	7	<p>Na página 6 da publicação do Conselho Regional de Enfermagem, intitulada: “Boas práticas: <b>cálculo seguro</b>”, disponível em: <a href="http://www.corensp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf">http://www.corensp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf</a>, há a seguinte afirmação:  "Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco-ampola de 5.000.000UI equivale a 2ml e no frasco de 10.000.000UI equivale a 4ml.”</p>	INDEFERIDO	

		<p>Isto significa que ao injetar o diluente no frasco de penicilina de 5.000.000UI, o volume total ficará com 2ml a mais e, no frasco-ampola de 10.000.000UI, com 4ml a mais.</p> <p>Então, se utilizarem-se 8ml de diluente no frasco-ampola de 5.000.000UI, conforme enunciado da questão, o volume total será de 10ml e não de 8ml como indica o candidato em sua argumentação.</p> <p>Assim sendo, aplicando a regra de três simples:</p> $\frac{5.000.000\text{UI}}{3500.000\text{UI}} = \frac{10\text{ml}}{X}$ $X = 7$ <p>Ver também em:</p> <p>BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação à Saúde. Departamento de Gestão da Educação na Saúde, Profae. <b>Profissionalização dos trabalhadores da área de enfermagem. Profissionalização de auxiliares de enfermagem: Cadernos do Aluno. Fundamentos de Enfermagem.</b> 2ª Ed, 2003. Disponível em: <a href="http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pae_cad3.pdf">http://portal.saude.gov.br/portal/arquivos/pdf/pae_cad3.pdf</a></p> <p>GIOVANI,A.M.M. <b>Enfermagem, cálculo e administração de medicamentos.</b>14ªed. São Paulo: Rideel, 2012.</p>		
--	--	---	--	--