

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 26

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Segundo a American Heart Association estudos publicados antes e desde 2005 demonstram que:

1- a qualidade das compressões torácicas continua necessitando de melhoria, embora a implementação das Diretrizes da AHA 2005 para RCP e ACE tenha sido associada a uma melhor qualidade de RCP e maior sobrevivência;

2- existe uma variação considerável na sobrevivência a PCR extra-hospitalar entre os serviços médicos de emergência/urgência (SME); e

3- a maioria das vítimas de PCR súbita extra-hospitalar não recebe nenhuma manobra de RCP de pessoas presentes no local.

Assim, as alterações recomendadas nas Diretrizes da AHA 2010 para RCP e ACE tentam, dentre outras, dar conta dessas questões, enfatizando, mais uma vez, a necessidade de uma RCP de alta qualidade, incluindo, dentre outras: **Frequência de compressão mínima de 100/minuto (em vez de "aproximadamente" 100/minuto, como era antes).**

Pelo exposto, a afirmativa do candidato de que a alternativa "A" da questão estaria correta, não procede.

Bibliografia:

American Heart Association. **Destaques das Diretrizes da American Heart Association 2010 para RCP e ACE.**

Disponível em:

http://www.heart.org/idc/groups/heart-public/@wcm/@ecc/documents/downloadable/ucm_317343.pdf

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 33

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Diferente da maioria das medicações, no solvente da penicilina cristalina, deve-se considerar o volume do soluto, que no frasco-ampola de 5.000.000 UI equivale a 2 ml e no frasco de 10.000.000 UI equivale a 4 ml.

Quando coloca-se 6 ml de água destilada em 1 frasco-ampola de 10.000.000 UI, obtém-se como resultado uma solução contendo 10ml.

Assim:

10.000.000 ----- 10

2.500.000 -----X

X: 2,5

Pelo exposto, a argumentação da candidata está incorreta.

Bibliografia:

COREN SP. **Boas práticas:Cálculo seguro** Volume II: Cálculo e diluição de medicamentos.

COREN: SãoPaulo. 2011. Disponível em:

http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 34

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Em uma prescrição de 50 UI de insulina NPH, tendo o frasco de 100 UI/ml, mas com seringas de 3 ml deve-se utilizar a fórmula:

Frasco – seringa

Prescrição – X

Contudo, se não há seringa própria de insulina, devemos utilizar a quantidade equivalente à seringa de insulina (1 ml)

Assim:

100 - 1

50 - X

X: 0,5

Resposta: Deve-se aspirar 0,5 ml na seringa de 3ml

Bibliografia:

1-COREN SP. **Boas práticas:Cálculo seguro** Volume II: Cálculo e diluição de medicamentos.

COREN: SãoPaulo. 2011. Disponível em:

http://www.coren-sp.gov.br/sites/default/files/boas-praticas-calculo-seguro-volume-2-calculo-e-diluicao-de-medicamentos_0.pdf

2- GIOVANI. A.M.M. **Enfermagem, cálculo e administração de medicamentos**. 14 ed. rev e ampl. São Paulo: Rideel, 2012.

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 38

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Segundo o Ministério da Saúde (MS), "no eventual planejamento de uma gravidez em gestantes com episódios depressivos leves, pode-se considerar a retirada gradual do antidepressivo. Já em gestantes com quadros depressivos graves ou refratários, a manutenção da medicação pode ser uma escolha, optando-se pelas drogas com maior evidência de segurança nesse período ou eventualmente pela realização de Eletroconvulsoterapia (ECT)". (MS, 2012: 230)

Ainda segundo o MS a indicação de ECT pode ser uma opção alternativa em casos de não resposta à medicação ou em episódios depressivos graves, com aspectos psicóticos, catatônicos ou sério risco suicida. Trata-se de um procedimento seguro, no qual a administração de curto prazo de anestésicos parece implicar pequenos riscos ao feto. É eficaz durante a gestação e pode ser a opção de tratamento preferencial da gestante.

Bibliografia:

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas Estratégicas. **Gestação de alto risco: manual técnico**. 5. ed. – Brasília : Editora do Ministério da Saúde, 2012.

Disponível em: http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/gestacao_alto_risco.pdf

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 39

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

O Ministério da Saúde, através do Caderno de Atenção Básica nº 23, recomenda a interrupção temporária da amamentação em caso de varicela. Na mesma publicação além da interrupção temporária da amamentação, recomenda ainda o isolamento da mãe, se esta apresentar vesículas na pele cinco dias antes do parto ou até dois dias após o parto, até que as lesões adquiram a forma de crosta.

Bibliografia:

BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Saúde da criança: nutrição infantil: aleitamento materno e alimentação complementar** Cadernos de Atenção Básica, n.º 23. Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2009

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: : Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 42

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

De acordo com Kurcgant (2010, p.131):

"A variável ausências não previstas é resultante de uma série de tipos de ausência, tais como: faltas abonadas e não abonadas; licença médica; licença-maternidade; licença-prêmio; licença por acidente de trabalho; licença INSS; outras licenças (casamento, nojo, paternidade etc) e suspensões, cujos valores diferem de uma categoria para outra. Todos esses tipos de ausências comportam-se como variáveis aleatórias, pois podem ocorrer em qualquer dia do ano."

Deste modo, a licença-prêmio é considerada ausência não prevista por tratar-se de benefício cuja concessão é efetuada conforme o que determina a lei, mas sua concretização enquanto ausência do trabalho depende do interesse do servidor em usufruir ou não, o que já explica a sua condição de não prevista.

Saber que a concessão existe, não quer dizer que se pode prever o momento do usufruto, uma vez que depende do desejo do servidor, que muitas vezes acumula para antecipar sua aposentadoria. Neste sentido, ainda segundo Kurcgant, "esse tipo de ausência comporta-se como variável aleatória, pois pode ocorrer em qualquer dia do ano" .

Entretanto, como a licença prêmio pode durar, por exemplo, 03 meses, a partir do momento em que se dá o início de seu usufruto, o período de ausência daquele servidor passa a ser conhecido.

Bibliografia:

KURCGANT, P. (coord.). **Gerenciamento de Enfermagem**. 2ª ed. Rio de Janeiro : Guanabara Koogan, 2010

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: : Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 50

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Segundo a referência bibliográfica: "Ações de Enfermagem para o controle do câncer: uma proposta de integração ensino-serviço". Instituto Nacional do Câncer. 3ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: INCA, 2008. p.572.

"Dentre as **vantagens** do cateter totalmente implantado, cabe ressaltar que esse dispositivo dispensa curativos; dispensa heparinizações frequentes; possui menor susceptibilidades a infecções; é mais estético; não limita as atividades físicas e **não exige treinamento do paciente e do familiar para o manuseio** e é menos sujeito a acidentes (quebra, perfuração, corrosão e outros)."

"Dentre as **desvantagens**, cabe citar que, para sua implantação e retirada, se faz necessário um procedimento cirúrgico, o que torna o custo mais elevado em relação aos outros dispositivos. Além disso, o seu acesso é realizado através de punções e para isso são utilizadas agulhas específicas. Outra ressalva se faz quanto à **dificuldade para infusão de grandes volumes, em relação ao cateter semi-implantado.**"

Pelo exposto, denota-se que a argumentação do candidato não procede.

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 53

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

O objetivo da questão é o candidato identificar situações/condições de **alto risco** para quedas. Neste sentido, o Protocolo do Programa Nacional de Segurança do Paciente do Ministério da Saúde, indica características de pacientes com alto risco de queda, a citar:

a) Paciente independente, que se locomove e realiza suas atividades sem ajuda de terceiros, mas possui pelo menos um fator de risco.

b) Paciente dependente de ajuda de terceiros para realizar suas atividades, com ou sem a presença de algum fator de risco. Ainda com auxílio (de pessoa ou de dispositivo) ou se locomove em cadeira de rodas.

c) Paciente acomodado em maca, por exemplo, aguardando a realização de exames ou transferência, com ou sem a presença de fatores risco."

Ainda a mesma publicação orienta que "paciente acamado, restrito ao leito, completamente dependente da ajuda de terceiros, com ou sem fatores de risco e Indivíduo independente e sem nenhum fator de risco" deve ser considerado como de baixo risco de queda.

Assim, Analisando as alternativas (A), (B) , (C) e (D) apresentadas na questão, apreende-se que referem-se aos pacientes considerados no protocolo como de baixo risco de queda.

Em relação a seguinte argumentação "a alternativa considerada correta pelo gabarito publicado, a alternativa (E), encontra-se incompleta e restringindo o "alto risco" à existência de apenas um fator de risco. Enquanto a literatura afirma que para o paciente ser classificado como alto risco para quedas ele tem que apresentar PELO MENOS UM fator de risco." , manifestamo-nos esclarecendo que **um fator** está incluído **em pelo menos um**, que quer dizer **no mínimo um**. Portanto, a formulação não discorda da referência utilizada.

Referência bibliográfica:

BRASIL, Ministério da Saúde. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Protocolos básicos de segurança do paciente**. Brasília: Ministério da Saúde. 2013.

Disponível em:

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/segurancadopaciente/documentos/julho/Protocolo%20-%20Prevenção%20de%20Quedas.pdf>

CONCURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE/2014

FORMULÁRIO DE RESPOSTA AOS RECURSOS

CARGO: : Nível Superior - Enfermeiro/Área

QUESTÃO: 60

DECISÃO SOBRE O(S) RECURSO(S):

DEFERIDO(S)

QUESTÃO ANULADA

ALTERAÇÃO DE GABARITO:

- DA LETRA ____ PARA A LETRA ____

INDEFERIDO(S)

JUSTIFICATIVA

Segundo bibliografia indicada no edital, Potter PA e Perry AG. Fundamentos de Enfermagem. 6ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005 (volume I, p. 677):

“A terapia não-farmacológica contra a febre usa métodos que aumentam a perda de calor por evaporação, condução, convecção ou radiação. Tradicionalmente os enfermeiros têm usado compressas mornas, banhos com soluções de água com álcool, aplicado gelo nas axilas e virilhas e ventilador. Essas terapias devem ser evitadas porque provocam tremor. Os tremores aumentam a febre por aumento da atividade muscular”

Dentre os procedimentos que utilizam meios físicos citados na bibliografia em pediatria encontra-se colocar compressas mornas ou envolver a criança em toalha úmida e morna e renovar frequentemente, a compressa ou toalha para que não sequem ou se aqueçam. Ainda afirmam que é um erro grave colocar a criança com febre alta em banho frio ou toalhas geladas.