



## CONCURSO PÚBLICO PARA TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Edital nº 216/2018

Nível Código

**E 119**

Cargo: **MÉDICO/ÁREA: GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA**

### CADERNO DE QUESTÕES

Instruções ao candidato – parte integrante do Edital – subitem 18.2

1. Verifique se recebeu o **Caderno de Questões**, o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**.
2. Confira se o **Caderno de Questões** é referente ao cargo ao qual está concorrendo. Verifique se constam deste **Caderno**, de forma legível, 65 (sessenta e cinco) questões objetivas e a proposta de **Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Será eliminado do Concurso o candidato que realizar prova para um cargo diferente do qual concorre.
3. Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no **Cartão de Respostas** e na **Folha de Redação**, caso contrário notifique imediatamente ao Fiscal. Leia atentamente as instruções contidas neles.
4. Cada questão objetiva proposta apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo apenas uma correta.
5. No **Cartão de Respostas**, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á pontuação zero a toda questão sem opção assinalada ou com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
6. Sob pena de eliminação do Concurso, na **Folha de Redação**, não faça qualquer registro que possa identificá-lo. Da mesma forma não é permitido que você faça uso de instrumentos auxiliares para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que sirva de consulta ou de comunicação.
7. O tempo para realização da Prova Objetiva e da Redação é de no mínimo **uma hora e trinta minutos** e no máximo **quatro horas e trinta minutos**. Os candidatos poderão levar o **Caderno de Questões**, faltando, no máximo, uma hora para o término da prova.
8. Durante a realização da prova será feita a coleta da impressão digital, colabore com o Fiscal.
9. Para preencher o **Cartão de Respostas** e a **Folha de Redação**, use apenas caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta.
10. Ao término da prova, entregue ao Fiscal o **Caderno de Questões**, a **Folha de Redação** e o **Cartão de Respostas** assinado. A não entrega do **Cartão de Respostas** e da **Folha de Redação**, implicará na sua eliminação do Concurso.
11. O Gabarito Preliminar será divulgado no dia 31 de março de 2019, a partir das 16 horas no endereço eletrônico do Concurso.
12. A imagem do **Cartão de Respostas**, contendo a assinatura, impressão digital e respostas assinaladas pelo candidato será divulgada no dia 10 de abril de 2019, a partir das 14 horas no endereço eletrônico do Concurso.

Após o aviso para o início da prova, o candidato deverá permanecer no local de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.



## Parte I: LÍNGUA PORTUGUESA

### TEXTO 1

#### A DISCIPLINA DO AMOR

Lygia Fagundes Telles

Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra: um jovem tinha um cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe.

Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o olhar naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata, voltava ao posto de espera. O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo, distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora, ele disparava para o compromisso assumido, todos os dias.

Todos os dias, com o passar dos anos (a memória dos homens!), as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se para outros familiares. Os amigos para outros amigos. Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina.

As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando? Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.

TELLES, Lygia Fagundes. A disciplina do amor. Disponível em: < <http://claricemenezes.com.br/2018/02/05/a-disciplina-do-amor/> >. Acesso em jan. 2019.

**01** Considerando-se a organização do texto, a autora utiliza

- (A) os tempos do presente, na maior parte, aproximando-se dos fatos, como se tivesse recorrido a uma câmara de zoom, e aumentando, portanto, a tensão narrativa.
- (B) um narrador onisciente, em 3ª pessoa, na maior parte do texto, tendo em vista que revela ao leitor uma visão mais aproximada

da narrativa, com detalhes da relação de um cão com o seu dono.

- (C) um narrador em 1ª pessoa, a que corresponde o papel de personagem e a não onisciência da narrativa, como fica claro na passagem “Mas eu avisei que o tempo era de guerra” (linha 14).
- (D) o tipo textual descritivo, predominantemente, com o objetivo de qualificar, nomear e situar os seres do mundo, sob um ponto de vista estático, como se verifica na passagem “Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra”. (linhas 1- 2).
- (E) o discurso direto, predominantemente, como é possível verificar na passagem: “As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?” (linhas 37-38)

**02** A palavra “disciplina” presente no título do texto faz referência

- (A) ao relógio preso à pata do cachorro.
- (B) à pontualidade dos animais domésticos.
- (C) à fidelidade de um cachorro a seu dono.
- (D) ao amor que existe entre o cão e o jovem.
- (E) à atitude das pessoas de irem todos os dias ao trabalho.

**03** A partir da leitura da passagem “Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata (...)” (linhas 22-23), é possível inferir que

- (A) o cachorro, assim que anoitecia, voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro, até chegar o dia seguinte quando o dono retornava.
- (B) o cachorro tinha um relógio preso ao corpo para esperar o dono sempre no mesmo horário.
- (C) os animais, apesar de irracionais, são muito espertos e conseguem saber reconhecer as horas.
- (D) as pessoas da vila conheciam o cachorro e faziam-lhe festinhas sempre no mesmo horário, para que ele soubesse a hora de esperar pelo dono.
- (E) o cachorro sempre esperava seu dono no mesmo horário.

**04** A passagem “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou, o focinho voltado para aquela direção.” (linhas 38-39) revela que o cachorro

- (A) morreu esperando o dono.
- (B) pressentia que o dono estava voltando.
- (C) continuou a esperar pelo dono todos os dias, no mesmo horário.
- (D) gostava de receber os afagos das pessoas que passavam por ele.
- (E) não queria perder cada movimento do retorno de seu dono.

05 A palavra “festinhas”, no texto, significa uma

- (A) pequena festa.
- (B) reunião divertida.
- (C) brincadeira alegre.
- (D) reunião de cachorros.
- (E) brincadeira sem importância.

06 A expressão “aquela direção” da passagem “(...) o focinho voltado para **aquela** direção.” (linha 39) refere-se

- (A) à esquina.
- (B) à praça da vila.
- (C) ao ponto de onde o jovem vinha.
- (D) ao lugar onde aconteceu a guerra.
- (E) à casa onde o jovem e o cão moravam.

07 O termo destacado em “Casou-se a noiva com um primo” (linha 32) exerce a função sintática de

- (A) sujeito.
- (B) objeto direto.
- (C) adjunto adnominal.
- (D) complemento nominal.
- (E) objeto indireto.

08 No trecho “... acompanhava-o com seu passinho saltitante de volta à casa”, a forma verbal destacada encontra-se no mesmo tempo verbal que a seguinte também sublinhada:

- (A) “Uma tarde (era inverno), ele lá ficou...”
- (B) “A vila inteira já conhecia o cachorro...”
- (C) “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?”
- (D) “Os familiares voltaram-se para outros familiares.”
- (E) “(...) como se tivesse um relógio preso à pata (...)”

09 O trecho “O jovem morreu num bombardeio, mas no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.” pode ser reescrito da seguinte forma, sem perda de sentido:

- (A) Como o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (B) Já que o jovem morreu num bombardeio, no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (C) O jovem morreu num bombardeio, portanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.
- (D) O jovem morreu num bombardeio, embora no pequeno coração do cachorro, não tenha morrido a esperança.

(E) O jovem morreu num bombardeio, entretanto no pequeno coração do cachorro, não morreu a esperança.

10 No trecho “Só o cachorro já velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua esquina”, as duas ocorrências do termo “jovem” exercem, respectivamente, as funções sintáticas de

- (A) predicativo e sujeito.
- (B) sujeito e objeto direto.
- (C) objeto direto e predicativo.
- (D) sujeito e adjunto adnominal.
- (E) adjunto adnominal e objeto direto.

## TEXTO 2 (Editado)

A pesquisa científica sobre os efeitos terapêuticos da relação entre seres humanos e animais de estimação começou nos Estados Unidos em meados de 1960. Depois de muitos estudos e observação, ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação. Pensando nisso, a Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet) possui um Grupo de Estudos sobre a Interação Humano e Animal (GE-INTERHA) para fomentar pesquisas que demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.

Essa convivência, segundo pesquisadores, é capaz de melhorar a autoestima, diminuir problemas do coração e auxiliar a família na diminuição do estresse, na queda da pressão em hipertensos e, principalmente, de melhorar a interação social.

Em um estudo realizado recentemente, ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios. Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes. Alguns casos mais conhecidos são os tratamentos de idosos e de crianças com paralisia cerebral, autismo ou hiperatividade.

Os cães e gatos são muito usados, pois são os animais mais próximos do ser humano. As suas visitas causam melhoras sociais, emocionais, físicas e cognitivas de pacientes em tratamento. Acariciar um animal, por si só, já ajuda o paciente a relaxar. Cães e gatos também servem como companhia para idosos solitários, evitando casos de depressão.

A relação entre seres humanos e animais de estimação. Jornal Cruzeiro do Sul, 24/05/13. Disponível em < <https://www2.jornalcruzeiro.com.br/materia/474869/a-relacao-entre-seres-humanos-e-animais-de-estimacao>>. Acesso em jan. 2019. (Adaptado)

- 11 É correto afirmar que o Texto 2
- (A) elenca vários benefícios entre o ser humano e os animais, dentre eles, a diminuição da pressão arterial em pessoas propensas à hipertensão.
  - (B) defende que os animais são solitários e, por isso, precisam da companhia dos humanos.
  - (C) contextualiza o Texto 1, ao asseverar que os animais domésticos evitam casos de depressão entre humanos.
  - (D) vai de encontro ao tema do Texto 1, ao considerar que há efeitos terapêuticos na relação entre seres humanos e animais.
  - (E) ratifica que é possível uma relação de amizade entre animal e ser humano.

12 Sob ponto de vista da Morfologia, a palavra formada pelo mesmo processo de formação do termo “tratamento” é

- (A) ajuda.
- (B) cerebral.
- (C) hipertenso.
- (D) autoestima.
- (E) estresse

13 Dentre as ocorrências da palavra “que”, em destaque nos trechos a seguir, todas são classificadas como pronome relativo, EXCETO

- (A) “(...) ficaram claros os benefícios que são gerados nessa interação.”
- (B) “(...) pesquisas que demonstrem a importância dos animais de estimação para a qualidade de vida das pessoas.”
- (C) “(...) foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes.”
- (D) “(...) ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios.”
- (E) “(...) ficou comprovado que, em geral, as famílias que têm animais de estimação gastam menos com remédios.”

14 No trecho “Além disso, foi criada a Terapia Assistida por Animais, que pode ser aplicada em diferentes casos médicos, com grandes melhorias para os pacientes”, a palavra sublinhada pode ser substituída por

- (A) onde.
- (B) cuja.
- (C) aonde.
- (D) a qual.
- (E) na qual.

15 As palavras “pesquisa”, “capaz” e “social”, ao serem flexionadas em número, passam por processos ligeiramente diferentes. Outras formas nominais flexionadas da mesma maneira são, respectivamente,

- (A) “cerebral”, “ser” e “vida”.
- (B) “vida”, “ser” e “animal”.
- (C) “cão”, “paciente” e “animal”.
- (D) “cão”, “cerebral” e “paciente”.
- (E) “paciente”, “vida” e “cão”.

## Parte II: NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

16 O ato de orçar dentro do serviço público é caracterizado pelo programa de trabalho, que define qualitativamente a programação orçamentária e deve responder, de maneira clara e objetiva, às perguntas clássicas que caracterizam esse ato. Sendo assim, dentro da programação qualitativa, no bloco da estrutura Classificação por Esfera, item da estrutura Esfera Orçamentária, a pergunta clássica a ser respondida é:

- (A) quem é o responsável por fazer?
- (B) em que áreas de despesa a ação governamental será realizada?
- (C) qual é o tema da política pública?
- (D) o que será entregue pela política pública?
- (E) em qual orçamento?

17 A estimativa do montante necessário para o desenvolvimento da ação orçamentária, no Orçamento Público, é uma atribuição da dimensão:

- (A) do capital.
- (B) física.
- (C) financeira.
- (D) patrimonial.
- (E) contábil.

18 De acordo com a classificação funcional da despesa, o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público e que reflete a competência institucional do órgão, como, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios, é a definição de:

- (A) esfera.
- (B) programa.
- (C) ação.
- (D) função.
- (E) elemento de despesa.

**19** É da iniciativa do Poder Executivo a Lei Orçamentária Anual que compreenderá os orçamentos:

- (A) fiscal, de investimento e da seguridade social.
- (B) de outras despesas correntes e de capital.
- (C) de pessoal, outras despesas correntes e de capital.
- (D) federal, estadual e municipal.
- (E) monetário e econômico.

**20** A Universidade Federal Fluminense - UFF, no seu orçamento anual, tem fixadas as despesas com aquisição de auxílio-alimentação e auxílio-transporte que, no Grupo de Natureza de Despesas (GND), são classificadas como:

- (A) pessoal e encargos sociais.
- (B) outras despesas correntes.
- (C) investimentos.
- (D) inversões financeiras.
- (E) vantagens e direitos.

**21** A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) apresentará a orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA), mas suas faculdades vão além dessa orientação. A seguir estão elencadas algumas outras atribuições da LDO, EXCETO:

- (A) dispor sobre as alterações na legislação tributária.
- (B) expressar as metas da administração pública federal.
- (C) estabelecer a estrutura e organização dos órgãos públicos.
- (D) estabelecer a política de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento.
- (E) expressar as prioridades da administração pública federal.

**22** A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada poder. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio:

- (A) do Ministério Público Federal.
- (B) do Tribunal de Contas da União.
- (C) do Supremo Tribunal de Justiça.
- (D) da Controladoria Geral da União.
- (E) da Secretaria de Orçamento e Finanças.

**23** O Ministério Público (MP) é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado. Os princípios institucionais do MP são:

- (A) a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional.
- (B) a pluralidade, a divisibilidade e a dependência.
- (C) a liberdade, a igualdade e a fraternidade.
- (D) a universalidade, a exclusividade e a periodicidade.
- (E) a responsabilidade, a eficiência e a eficácia.

**24** De acordo com o princípio orçamentário da periodicidade, o período de tempo ao qual se referem a previsão das receitas e a fixação das despesas é denominado de:

- (A) ano civil.
- (B) intervalo orçamentário e financeiro.
- (C) ano orçamentário.
- (D) exercício financeiro.
- (E) período contábil.

**25** A etapa da receita orçamentária que, além de ser base para se estimarem as necessidades de financiamento do governo, antecede a fixação do montante de despesas que irá constar nas leis de orçamento, consiste na etapa:

- (A) da arrecadação.
- (B) do recolhimento.
- (C) da execução.
- (D) do lançamento.
- (E) da previsão.

**26** As receitas do Governo Federal podem ser divididas em primárias e financeiras de acordo com a classificação por identificador de resultado primário. As receitas primárias advêm dos tributos, das contribuições sociais, das concessões, dos dividendos recebidos pela União, doações e convênios e outras receitas primárias. Esse tipo de receita refere-se, predominantemente, às:

- (A) receitas de capital.
- (B) receitas correntes.
- (C) transferências de capital.
- (D) operações de crédito.
- (E) receitas de capital intraorçamentárias.

**27** É permitida, de acordo com a legislação, para as despesas contratuais e outras, sujeitas a parcelamento, a emissão de empenho do tipo:

- (A) global.
- (B) estimativo.
- (C) ordinário.
- (D) simples.
- (E) desmembrado.

**28** Na codificação: 3.3.90.18.00, pode-se identificar uma determinada classificação da despesa por natureza, sendo sua identificação pelos dígitos e seus correspondentes níveis. O 1º dígito identifica a Categoria Econômica, o 2º dígito identifica o Grupo de Despesa, o 3º e 4º dígitos identificam a Modalidade de Aplicação, o 7º e 8º dígitos identificam o Subelemento da Despesa. O 5º e 6º dígitos são responsáveis por indicar o nível de despesa denominado:

- (A) função da despesa.
- (B) aplicação da despesa.
- (C) elemento de despesa.
- (D) execução da despesa.
- (E) fonte da despesa.

**29** Receitas públicas, em sentido amplo, são ingressos de recursos financeiros nos cofres públicos, que se desdobram em receitas orçamentárias, quando representam disponibilidades de recursos financeiros para o erário, e ingressos extraorçamentários, quando representam:

- (A) receitas de serviços.
- (B) transferências correntes.
- (C) contribuições.
- (D) receitas correntes intraorçamentárias.
- (E) apenas entradas compensatórias.

**30** De acordo com a Lei 4.320/64, o ato da repartição competente verificar a procedência do crédito fiscal e a pessoa que lhe é devedora, e inscrever o débito desta, é a definição para o estágio da receita pública denominado de:

- (A) recolhimento
- (B) recebimento.
- (C) previsão
- (D) lançamento.
- (E) arrecadação.

### Parte III: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

**31** Sobre a fisiologia do ciclo menstrual, está correto afirmar que:

- (A) o hormônio de liberação da gonadotrofina é produzido no núcleo arqueado e secretado de forma pulsátil para a circulação porta-hipofisária onde segue para a neuro-hipófise.
- (B) níveis crescentes de estrogênio produzem feedback positivo sobre a secreção hipofisária de FSH, que começa a aumentar no meio folicular.
- (C) os androgênios possuem dois papéis reguladores diferentes no desenvolvimento folicular: em altas concentrações servem para estimular a atividade da aromatase

através de receptores específicos nas células granulosas; com níveis mais baixos de androgênios, há intensa atividade da 5 $\alpha$ -redutase, que converte os androgênios em formas que podem ser aromatizadas.

- (D) a progesterona, o estrogênio e a inibina-A atuam em nível central para suprimir a secreção de gonadotrofina e o crescimento de novos folículos.
- (E) os esteroides sexuais não são as únicas gonadotrofinas que controlam o desenvolvimento folicular; foram identificados dois peptídeos relacionados, derivados das células granulosas: um deles, a ativina, bloqueia a liberação de FSH da hipófise e diminui sua ação no ovário.

**32** A massa paraovariana sólida mais comum é:

- (A) resíduos sólidos do ducto de Wolff.
- (B) sarcoma.
- (C) linfoma.
- (D) paraganglioma.
- (E) leiomioma.

**33** Com relação à síndrome do ovário policístico (SOP), é correto afirmar que:

- (A) níveis elevados de androgênios séricos contribuem para anormalidades nos perfis lipídicos das pacientes.
- (B) as proporções LH/FSH são baixas em cerca de oitenta por cento das mulheres.
- (C) as mulheres com SOP apresentam aumento da sensibilidade à insulina que aparentemente se deve a uma anormalidade pós-ligação na transdução de sinal mediada por receptor insulínico.
- (D) a produção estrogênica é menor em pacientes obesas com SOP.
- (E) o hiperandrogenismo, em geral, se manifesta por sinais de virilização, como aumento da massa muscular, engrossamento da voz e clitoromegalia, que são típicos na SOP.

**34** O prolapso de órgão pélvico pode ser avaliado ao exame físico pelo Sistema de Baden-Walker. Assim, uma deiscência que ocorra até o hímen é classificada como grau:

- (A) 1.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.
- (E) 5.

**35** Os tipos de papilomavírus humano mais especificamente associados a tumores (neoplasia intraepitelial) invasivos são:

- (A) 6 e 11.
- (B) 11 e 16.
- (C) 16 e 18.
- (D) 18 e 35.
- (E) 16 e 35.

**36** Com relação ao estadiamento cirúrgico do câncer do endométrio, está correto afirmar que:

- (A) o estadiamento cirúrgico ampliado, com linfadenectomia pélvica e para-aórtica seletiva, implica aumento expressivo da morbidade por histerectomia.
- (B) deve-se considerar a omentectomia parcial em algumas pacientes de alto risco, com tumores papilares serosos e mullerianos mistos, que tendem à disseminação intra-abdominal e recorrência abdominal alta.
- (C) a invasão de trinta por cento do miométrio é uma das indicações de dissecação seletiva dos linfonodos pélvicos e para-aórticos.
- (D) como em mais de setenta por cento das pacientes com metástases linfáticas ocorre aumento macroscópico dos linfonodos, a palpação é alternativa aceitável à biópsia.
- (E) o estadiamento cirúrgico tem pouca importância quando se considera a excelente correlação entre avaliação pré-operatória e estadiamento clínico com os achados cirúrgicos patológicos.

**37** Extremidades não fundidas dos ductos paramesonérficos dão origem:

- (A) aos ovários.
- (B) ao seio urogenital posterior.
- (C) às tubas uterinas.
- (D) ao ligamento útero-sacro.
- (E) ao ligamento útero-ovárico.

**38** Sobre os tumores filoides da mama, está correto afirmar que:

- (A) o envolvimento axilar é muito raro nos tumores malignos.
- (B) as lesões bilaterais são muito frequentes e em geral apresentam-se como massas isoladas, sendo difícil de distingui-las de um fibroadenoma.
- (C) A maioria deles é maligna (sessenta e cinco por cento) em comparação com as lesões benignas (vinte e oito por cento) e limítrofes (sete por cento).
- (D) a quimioterapia para os tumores metastáticos deve ser baseada em esquemas para o adenocarcinoma.
- (E) a mamografia mostra um halo em torno destes tumores, o que o distingue com segurança de um fibroadenoma.

**39** Utilizando-se o estadiamento do câncer vaginal da Federação Internacional de Ginecologia e Obstetrícia, está correto afirmar que o carcinoma que se estende até a parede pélvica enquadra-se no estágio:

- (A) II.
- (B) III.
- (C) IV.
- (D) IVa.
- (E) IVb.

**40** Acerca das infecções vaginais, está correto afirmar que:

- (A) o fármaco de escolha no tratamento da vaginose bacteriana é a clindamicina, 300 miligramas via oral, duas vezes ao dia, por 3 dias.
- (B) em geral o pH da vagina em pacientes com candidíase vulvovaginal é maior que 4,5, e o teste das aminas é negativo.
- (C) na vaginose bacteriana foi demonstrada melhora da resposta terapêutica com o tratamento do parceiro sexual masculino que, portanto, é recomendável.
- (D) a vaginite inflamatória descamativa caracteriza-se pela exsudação difusa, esfoliação de células epiteliais, corrimento aquoso abundante e pH das secreções vaginais sempre maior que 4,5.
- (E) nas pacientes com vaginite por trichomonas com altas concentrações de organismos pode-se observar eritema vaginal segmentar e colpíte macular.

**41** Sobre os tumores do seio endodérmico (TSE), está correto afirmar que:

- (A) as características histológicas do TSE são bastante distintas; as células redondas, ovoides ou poligonais grandes têm citoplasma abundante, núcleos grandes e irregulares e nucléolos proeminentes.
- (B) o TSE representa o segundo tipo mais frequente de tumores de células germinativas do ovário.
- (C) a maioria das lesões secreta alfa1-antitripsina e, raramente, é capaz de produzir alfafetoproteína.
- (D) o TSE é unilateral em cem por cento dos casos; assim, está contraindicada a biópsia do ovário oposto em pacientes jovens.
- (E) o tratamento do TSE consiste em exploração cirúrgica, salpingo-ooforectomia do lado da lesão e biópsia de congelação para o diagnóstico; o acréscimo de histerectomia e salpingo-ooforectomia contralateral melhora significadamente o resultado.

**42** O microrganismo mais frequentemente associado ao abscesso de mama em não lactantes é:

- (A) Staphylococcus epidermidis.
- (B) Streptococcus beta-hemolítico.
- (C) Staphylococcus aureus.
- (D) Pseudomonas aeruginosa.
- (E) Proteus mirabilis.

**43** Com base nas diretrizes brasileiras (INCA - Ministério da Saúde) para o rastreamento do câncer do colo de útero, é correto afirmar que:

- (A) os exames periódicos devem seguir até os 59 anos de idade; para mulheres com mais de 59 anos que nunca se submeteram ao exame citopatológico devem ser realizados dois exames com intervalo de 1 ano e, se ambos forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames adicionais.
- (B) mulheres sem história de atividade sexual devem ser submetidas ao rastreamento a cada três anos.
- (C) o início da coleta deve ser 21 anos de idade para as mulheres que já tiveram ou têm atividade sexual; o rastreamento antes dos 21 anos deve ser evitado.
- (D) mulheres HIV positivas com contagem de linfócitos CD4+ abaixo de 200 células/mm<sup>3</sup> devem ter priorizada a correção dos níveis de CD4+ e, enquanto isso, devem ter o rastreamento citológico a cada seis meses.
- (E) mulheres na pós-menopausa, sem história de diagnóstico ou tratamento de lesões precursoras, apresentam baixíssimo risco para desenvolvimento de câncer, ficando dispensadas de rastreamento.

**44** Com relação às vulvectomias para tratamento de neoplasias, está correto afirmar que:

- (A) a vulvectomia completa radical costuma ser realizada através de três incisões: uma para a vulvectomia e uma para cada lado da linfadenectomia bilateral.
- (B) a vulvectomia parcial radical se refere à remoção completa da porção da vulva que contém o tumor, qualquer que seja sua localização, com margens de três a cinco centímetros de pele e preservação da membrana perineal.
- (C) a vulvectomia anterior exige a remoção do clitóris e ressecção total dos grandes lábios, com preservação dos pequenos lábios e monte púbico.
- (D) a vulvectomia posterior envolve a remoção de uma porção dos grandes lábios e do corpo perineal superior com preservação das glândulas de Bartholin.
- (E) a incisão em bloco, chamada coloquialmente de "borboleta", é a técnica mais usada de vulvectomia parcial radical, devido à alta recorrência dos tumores da vulva.

**45** A amina quaternária antimuscarínica que pode ser utilizada no tratamento farmacológico da bexiga hiperativa é:

- (A) oxibutinina.
- (B) duloxetina.
- (C) cloreto de tróspio.
- (D) fenilpropanolamina.
- (E) imipramina.

**46** Com relação à contracepção, está correto afirmar que:

- (A) os contraceptivos orais contendo apenas progestogênio devem ser evitados na lactação, pois afetam a quantidade e qualidade do leite.
- (B) o levonorgestrel 1,5 miligramas via oral é o recurso hormonal mais eficaz na contracepção de emergência.
- (C) a contracepção de emergência com DIU de cobre é muito efetiva até no máximo setenta e duas horas após a relação sexual.
- (D) o uso de contraceptivos hormonais na forma injetável e de implante contendo apenas progestogênio resulta em taxas de gravidez muito baixas, porém com o risco aumentado de tromboembolismo.
- (E) estudos recentes têm demonstrado que as atuais associações de estrogênio-progestogênio em baixas doses aumentam o risco de infarto, mesmo em não tabagistas abaixo de trinta e cinco anos sem outros riscos para doença vascular.

**47** Sobre as dismenorreias, é correto afirmar que:

- (A) na dismenorreia secundária, a dor frequentemente surge doze a vinte quatro horas antes do fluxo menstrual e persiste alguns dias após cessar o sangramento.
- (B) o aumento da síntese de prostanoídes em mulheres com dismenorreia primária resulta em maior tônus uterino, com contrações de grande amplitude.
- (C) os contraceptivos hormonais são mais propensos a proporcionar alívio da dor em mulheres com dismenorreia secundária.
- (D) em geral, a dor da dismenorreia primária começa vinte e quatro a quarenta e oito horas após o início de um período menstrual e pode durar até cinco dias.
- (E) a causa mais comum de dismenorreia secundária é a adenomiose.

**48** Gestante, 40 anos, obesa, diabética, apresentando durante o período expulsivo dificuldade no desprendimento das espáduas. Comprovada a distocia de ombros, é correto afirmar sobre a primeira medida a ser adotada:

- (A) colocar a paciente em posição de quatro apoios e realizar o desprendimento dos ombros nesta posição.
- (B) tração controlada do polo cefálico, com pressão no fundo uterino realizada por auxiliar.
- (C) o auxiliar deve elevar os membros inferiores da paciente com hiperflexão das coxas sobre o abdome e aplicar pressão suprapúbica.
- (D) deve-se recolocar a cabeça fetal no canal de parto e realizar cesariana.
- (E) extração do membro posterior e realizar pressão suprapúbica para desalojar o ombro anterior da sínfise púbica.

**49** Uma primigesta chega à maternidade com queixa de perda de líquido há 4 horas, com gestação de 35 semanas. Ao exame especular, visualiza-se o colo uterino longo em posição intermediária, dando saída a líquido claro. A medida do fundo uterino é compatível com a idade gestacional e a atividade uterina é nula. É a melhor maneira de conduzir este caso:

- (A) interrupção imediata por via alta.
- (B) internar a paciente para conduta expectante.
- (C) a indução do trabalho de parto deve ser considerada, após certificar-se da higidez fetal.
- (D) corticoterapia por 48 horas e posterior indução do parto.
- (E) acompanhamento ambulatorial aguardando o início do trabalho de parto.

**50** Com relação à analgesia durante o trabalho de parto e parto, avalie as afirmativas abaixo.

- I A depressão neonatal provocada pela meperidina depende do tempo entre a administração e o parto, havendo maior risco quando este ocorre entre a primeira e a quarta hora após a administração da droga.
- II O uso do óxido nitroso causa efeitos adversos fetais, principalmente quando se observa o índice de Apgar.
- III O bloqueio peridural não aumenta a incidência de cesariana quando comparada à analgesia sistêmica, mesmo quando iniciada precocemente.
- IV É recomendável repetir a punção do espaço subaracnóideo como técnica de analgesia, quando o efeito obtido na primeira punção não for satisfatório.

Das afirmativas acima, estão corretas apenas:

- (A) I e III.
- (B) I e II.
- (C) I, II e III.
- (D) I, II e IV.
- (E) II e IV.

**51** Paciente com 8 semanas de gestação realizou exames de rotina pré-natal, sendo detectado na sorologia para toxoplasmose quadro laboratorial compatível com infecção aguda. A melhor conduta será:

- (A) iniciar o tratamento com pirimetamina + sulfadiazina + ácido fólico, devido à eficácia superior à espiramicina.
- (B) como o risco de transmissão fetal é pequeno no primeiro trimestre e o potencial de risco dos medicamentos é alto, o tratamento deverá ser iniciado no segundo trimestre com pirimetamina e mantido até o nascimento.
- (C) início imediato da espiramicina e manutenção até o final da gestação.
- (D) início imediato da espiramicina; realizar amniocentese em torno de 18 semanas e, na presença de infecção fetal, mudar o tratamento para sulfadiazina + pirimetamina + ácido fólico até o final da gestação.
- (E) aguardar a 18ª semana para realizar a amniocentese e só iniciar o tratamento com espiramicina na presença de infecção fetal.

**52** Com relação ao acompanhamento da gestante portadora do HIV, avalie as afirmativas abaixo.

- I A terapia antirretroviral (TARV) está indicada para toda gestante infectada pelo HIV, independente de critérios clínicos e sorológicos.
- II A supressão da carga viral é um fator determinante na redução da transmissão vertical.
- III O início do tratamento pode ser retardado pela espera do resultado da genotipagem, permitindo a escolha de um esquema antirretroviral eficaz.
- IV Gestantes em uso de raltegravir necessitam de monitoramento da função hepática durante toda a gestação.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) apenas II e IV.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas I, III e IV.
- (E) apenas I, II e IV.

**53** Avalie as afirmativas abaixo sobre as características específicas da gestação gemelar.

- I A prematuridade é elevada, atingindo taxas de 50%.
- II A transfusão feto-fetal é condição que ocorre nos gemelares dicoriônicos.
- III Está associada às maiores taxas de complicações maternas como hipertensão e hemorragias.
- IV O uso de indutores da ovulação não interfere na chance de gestação gemelar porque apenas um óvulo é fecundado.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) I, II, III e IV.
- (B) apenas I, II e III.
- (C) apenas II e IV.
- (D) apenas I e IV.
- (E) apenas I e III.

**54** Avalie as afirmativas abaixo, considerando algumas intercorrências clínicas na gravidez.

- I O hipotireoidismo não tratado tem sido relacionado com maior risco de abortamento e prematuridade.
- II Gestante com doença cardíaca classe funcional "III" possui grande limitação frente a um esforço físico.
- III A presença de anticorpos antifosfolípidos nas gestantes com lúpus está associada a resultados perinatais desfavoráveis.
- IV O uso de corticoides inalatórios para tratamento da asma está contraindicado na gestação.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas II, III e IV estão corretas.
- (B) apenas II e III estão corretas.
- (C) apenas I e IV estão corretas.
- (D) apenas I, II e III estão corretas.
- (E) apenas IV está correta.

**55** Avalie as afirmativas abaixo, com relação às gestantes portadoras de anemia falciforme.

- I Existe risco aumentado para prematuridade e recém-nascido pequeno para a idade gestacional (PIG).
- II Devido ao risco aumentado de infecções maternas, deve-se realizar urinocultura mensalmente durante o pré-natal.
- III Os eventos maternos mais graves incidem principalmente no terceiro trimestre e no pós-parto.
- IV Os melhores resultados perinatais estão associados ao parto vaginal.

Das afirmativas acima, estão corretas:

- (A) apenas I e IV.
- (B) apenas I e III.
- (C) apenas I, II e III.
- (D) apenas II e IV.
- (E) I, II, III e IV.

**56** A respeito da doença trofoblástica gestacional (DTG), está correto afirmar que:

- (A) durante o seguimento pós-molar, para melhor monitoração dos níveis de hCG, não deve ser utilizado o anticoncepcional oral.
- (B) a histerectomia com preservação dos anexos reduz o risco de neoplasia trofoblástica gestacional quando comparada com o esvaziamento por aspiração.
- (C) o coriocarcinoma é um tumor que se caracteriza por ser muito invasivo, mas não produzir metástases.
- (D) os cistos tecaluteínicos muito volumosos devem ser removidos cirurgicamente para auxiliar na regressão do hipertireoidismo.
- (E) o tumor trofoblástico de sítio placentário (PSTT) é uma forma rara de DTG, sendo a que melhor responde à quimioterapia.

**57** Sobre a etiologia, formas clínicas e tratamento dos casos de abortamento, está correto afirmar que:

- (A) o abortamento infectado estágio III é uma forma extremamente grave, com presença de peritonite, sepse e/ou choque séptico.
- (B) o abortamento infectado estágio II compromete todo o miométrio, sem extensão ao paramétrio e anexos.
- (C) na ameaça de abortamento, encontra-se o colo permeável e a paciente se queixa de cólicas, mas sem sangramento.
- (D) o esquema de antibióticos que deve ser usado inicialmente no abortamento infectado, quando não se tem isolamento do patógeno, é a associação de ampicilina com metronidazol.
- (E) as principais doenças endócrinas que se associam ao abortamento são o hipertireoidismo, o diabetes mellitus e a insuficiência da fase luteínica.

**58** Considerando a presença de hipertensão arterial crônica (HAC) durante a gestação, avalie as afirmativas abaixo.

- I A hipertensão por doença renal é a forma mais frequente de hipertensão secundária na gestação.
- II A HAC é classificada como leve quando se observa a pressão sistólica entre 120 e 139 mmHg e a diastólica entre 80 e 99 mmHg.
- III A nifedipina não deve ser utilizada nas crises hipertensivas em pacientes sob tratamento com rifampicina, porque não atingiria os níveis plasmáticos eficientes.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas II e III estão corretas.
- (B) apenas I e II estão corretas.
- (C) apenas I está correta.
- (D) apenas I e III estão corretas.
- (E) apenas III está correta.

**59** A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, de evolução crônica, que pode ser transmitida por via sexual ou de forma vertical durante a gestação. Sobre a sífilis, está correto afirmar que:

- (A) o seguimento fetal após o tratamento é feito através da sorologia materna (dosagem do VDRL).
- (B) o condiloma plano, lesão hipertrófica nas regiões de dobra ou atrito, é observado na sífilis terciária.
- (C) a lesão primária (cancro duro) aparece em média 10 dias após o contato sexual infectante.
- (D) o tratamento é considerado adequado quando finalizado pelo menos 15 dias antes do parto.
- (E) a infecção congênita pode ser sugerida pela ultrassonografia obstétrica, quando se observam hepatomegalia, hidropsia e placentomegalia, entre outros achados.

**60** No estudo ultrassonográfico e dopplervelocimétrico de uma gestação cursando com crescimento intrauterino restrito (CIUR), é correto afirmar que:

- (A) a medida da circunferência abdominal fetal se altera tardiamente, e por isso não deve ser utilizada como método precoce para o diagnóstico.
- (B) a medida isolada do diâmetro biparietal é o método mais simples, porém o mais impreciso para caracterizar o CIUR.
- (C) a oligodramnia está sempre presente na restrição do crescimento, mas não se relaciona com o prognóstico da gestação.
- (D) no feto com CIUR constitucional, a dopplervelocimetria estará sempre alterada.
- (E) nos casos de CIUR de início tardio, a atenção deve centrar-se no doppler da artéria umbilical.

**61** O tratamento da gestação ectópica deve ser avaliado caso a caso, dependendo de alguns parâmetros. Sobre este tema, avalie as afirmativas abaixo.

- I O tratamento medicamentoso com metotrexato pode ser indicado para pacientes hemodinamicamente estáveis, com dosagem de  $\beta$ -hCG  $\leq$  5.000 mUI/mL e presença de atividade cardíaca fetal.
- II Quando não ocorre queda da dosagem do  $\beta$ -hCG em pelo menos 15% sete dias após o uso do metotrexato, não se pode repetir a medicação, estando indicado o tratamento cirúrgico.
- III A utilização de dose única e o protocolo de múltiplas doses de metotrexato apresentam a mesma taxa de resolução da gestação ectópica.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas II está correta.
- (B) apenas III está correta.
- (C) apenas I e III estão corretas.
- (D) apenas I e II estão corretas.
- (E) apenas II e III estão corretas.

**62** A hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica, sendo uma das principais causas de mortalidade materna. Considerando este tema, avalie as afirmativas abaixo.

- I Hipotonia e atonia uterina são as causas mais comuns de hemorragia puerperal, surgindo habitualmente na primeira hora pós-parto.
- II O uso de anestésicos gerais halogenados está relacionado à maior incidência de atonia uterina.
- III Quando indicada, a histerectomia deve ser total, por conta do sangramento proveniente do colo uterino.

Das afirmativas acima:

- (A) apenas I está correta.
- (B) apenas I e III estão corretas.
- (C) apenas I e II estão corretas.
- (D) apenas II está correta.
- (E) todas estão corretas.

**63** Com relação às histerectomias (HT), é correto afirmar que a HT:

- (A) radical modificada é adequada para tratar tumores com profundidade de invasão de três a cinco milímetros e tumores menores em estágio IB.
- (B) extrafacial remove o útero, o colo uterino, com excisão do paramétrio.

- (C) radical modificada remove o colo do útero, a vagina proximal, preservando o tecido parametrial e paracervical.
- (D) simples remove o útero, o colo uterino, com excisão do paracolpo.
- (E) radical requer maior excisão dos paramétrios, porém preserva a parede pélvica lateral.

**64** O aumento do número de gestações complicadas pelo diabetes é uma realidade. O diagnóstico pode ser feito antes ou durante a gestação. Considere as seguintes assertivas.

- I Diabetes mellitus gestacional (DMG) é definido como intolerância à glicose diagnosticada pela primeira vez durante a gestação, independente da dosagem glicêmica pós-parto.
- II Anencefalia, agenesia renal e atresia anal/retal são anomalias congênitas relacionadas ao diabetes mellitus materno.
- III A cardiocotografia é considerada um dos melhores métodos não invasivos de avaliação do bem-estar fetal nas gestantes diabéticas, com alto valor prognóstico, garantindo um feto saudável por pelo menos 7 dias após um resultado reativo.

Das assertivas acima:

- (A) apenas II e III estão corretas.
- (B) apenas I e III estão corretas.
- (C) apenas I e II estão corretas.
- (D) apenas I está correta.
- (E) todas estão corretas.

**65** É considerada como fator de risco maior para tromboembolismo venoso na gravidez e puerpério, sendo que sua presença de forma isolada é indicação para a anticoagulação:

- (A) infecção pós-parto.
- (B) obesidade.
- (C) gestação múltipla.
- (D) insuficiência venosa de membros inferiores.
- (E) multiparidade.

Espaço reservado para rascunho

## Parte IV: PROVA DE REDAÇÃO

### Instruções

- 1 O texto deve ser escrito na modalidade culta da Língua Portuguesa.
- 2 O rascunho da Redação deve ser feito no espaço apropriado.
- 3 O texto definitivo deve ser escrito à tinta, na folha própria, entre 20 e 25 linhas.
- 4 A redação que apresentar cópia dos textos da Proposta de Redação ou do Caderno de Questões terá o número de linhas copiadas desconsiderado para efeito de correção.
- 5 Em qualquer das situações expressas a seguir, será atribuída a nota zero à redação que:
  - 5.1 tiver menos de 20 linhas;
  - 5.2 fugir ao tema ou que não atender ao tipo dissertativo–argumentativo;
  - 5.3 apresentar identificação do participante;
  - 5.4 apresentar termos inadequados, tais como: vocabulário ofensivo, vulgar e/ou obsceno, receitas culinárias, orações, pedidos de ajuda, súplicas, ameaças, protestos, desenhos etc.

### TEXTO 1



Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/> > Acesso em jan. 2019.

### TEXTO 2

**Todos são iguais perante a lei** é uma frase que todo brasileiro já ouviu em sua vida, seja em meio a uma discussão de um direito, uma brincadeira entre amigos, análises jornalísticas nem sempre tão embasadas, entre outros momentos. Contudo, nos cabe fazer uma pergunta: será que realmente todos são iguais perante a lei?

O principal embasamento para a frase “todos são iguais perante a lei” é o princípio constitucional da isonomia, também chamado de princípio da igualdade. Veja o que diz o “caput” do art. 5º da Constituição Federal:

“Art. 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes”.

Pela simples leitura do artigo constitucional, temos a impressão de que cada cidadão residente no Brasil deve ser tratado de maneira igual independente de sua condição econômica, raça, credo, sexo, e assim por diante. Contudo, não é o que ocorre na prática e isso, nem sempre, é motivo de preocupação ou algo ruim.

Antigamente, o grande e saudoso Ruy Barbosa já dizia que a regra da igualdade é tratar desigualmente os desiguais na medida em que se desiguam.

Você pode estar pensando agora: como assim, tratar desigualmente os desiguais se todos são iguais perante a lei?

De forma simples, sem adentrarmos em questões filosóficas ou profundamente jurídicas, (...), o que o princípio da isonomia e o nobre Ruy Barbosa querem dizer é que a verdadeira desigualdade seria tratar igualmente aqueles que são desiguais. Veja [um exemplo] para facilitar a sua compreensão.

Exemplo 1: Não há dúvidas de que homens e mulheres possuem inúmeras diferenças biológicas e psicológicas, para citar apenas duas. Tanto os homens como as mulheres possuem direitos e deveres trabalhistas, porém, a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) contém a Seção I do Capítulo III chamada “Da proteção do trabalho da mulher”, em que existem regras específicas às trabalhadoras e isto não é nenhum desrespeito ao princípio da igualdade.

(...)

PIACENTI, Felipe. Todos são iguais perante a lei? In: Direito de todos, 02/06/2015. Disponível em: < <https://direitodetodos.com.br/todos-sao-iguais-perante-a-lei/> > Acesso em jan. 2019. (Adaptado).

Após a leitura dos textos 1 e 2, desenvolva seu texto dissertativo-argumentativo a partir das seguintes questões:

**TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI? A VERDADEIRA DESIGUALDADE SERIA TRATAR IGUALMENTE AQUELES QUE SÃO DESIGUAIS?**

Defenda seu ponto de vista sobre o tema, apresentando argumentos consistentes, de maneira clara e encadeada. Preste atenção à progressão textual, à coesão e à coerência.

5

10

15

20

25

RASCUNHO