

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA UFF – RJ – EDITAL N° 216/ 2018

RESPOSTAS AOS RECURSOS

Disciplina: Parte III: Médico/Área: Psiquiatria

Nível: SUPERIOR

N° da Questão	Opção de Resposta por extenso	Parecer da Banca	Deferido ou Indeferido	Questão anulada ou Opção de Resposta correta
31	D - orbicular dos lábios.	O enunciado apresenta a definição do reflexo orbicular do lábio: a projeção do lábio em função da estimulação do músculo orbicular do lábio em resposta ao estímulo produzido na linha média da face. O reflexo de sucção caracteriza-se por movimento de sucção em resposta à estimulação de qualquer parte da região perioral ocasionando desvio para o lado estimulado e movimentos de sucção. Referência: Dalgalarondo, Paulo. Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais (Locais do Kindle 1596-1598). Artmed. Edição do Kindle.	Indeferido	
46	E - somente I, II e IV.	A Olanzapina é excretada pelo leite materno, motivo pelo qual a amamentação é desaconselhável. "É considerado um Antipsicótico atípico (antagonista de serotonina e dopamina; antipsicótico de segunda geração) e também um estabilizador do humor" Referência Stahl, Stephen M.. Fundamentos de Psicofarmacologia de Stahl: Guia de Prescrição (Página 551 - 555). . Edição do Kindle.	Indeferido	
49	C - I, II, III e IV.	Farmacocinética do Alprazolam • Metabolizado por CYP450 3A4 • Metabólitos inativos • Meia-vida de eliminação de 12 a 15 horas • Alimentos não afetam a absorção. Referência Stahl, Stephen M.. Fundamentos de Psicofarmacologia de Stahl: Guia de Prescrição (Página 27). . Edição do Kindle.	Indeferido	

50	A - Benedict Morel.	vide texto da referência "Duas figuras importantes na psiquiatria e na neurologia que estudaram o transtorno foram Emil Kraepelin (1856-1926) e Eugen Bleuler (1857-1939). Antes deles, Benedict Morel (1809-1873), um psiquiatra francês, tinha usado o termo <i>démence précoce</i> para descrever pacientes deteriorados cuja doença começava na adolescência." Referência Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. <i>Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica</i> (Página 300). Edição do Kindle.	Indeferido	
57	C - inibidores seletivos de recaptção de serotonina.	Mais de uma opção correta	DEFERIDO	ANULADA
58	A - apenas I, III e IV.	..."informações pertinentes, como resultados de exames e fatos sobre o caso, e até mesmo organizar a mobília de maneira apropriada pode fazer o paciente se sentir mais confortável" Referência: Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. <i>Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica</i> (Página 1363). . Edição do Kindle.	Indeferido	
60	D - transtorno esquizoafetivo.	No caso clínico são ressaltados sintomas delirantes de primeira ordem, característicos da esquizofrenia, em concomitância com sintomas afetivos do tipo maníaco, com sintomas do humor presentes na maior parte do tempo. O quadro atende aos critérios diagnósticos para Transtorno esquizoafetivo segundo ambas as classificações diagnósticas (CID 10 e DSM) . A questão solicita "O diagnóstico mais provável diante deste episódio", que é caracteristicamente esquizoafetivo. Referência: WHO. CID -10 <i>Descrições Clínicas e diretrizes diagnósticas</i> . Página 104	Indeferido	
62	C - traços de personalidade borderline.	Vide Referência: Sadock, Benjamin J.; Sadock, Virginia A.; Ruiz, Pedro. <i>Compêndio de Psiquiatria: Ciência do Comportamento e Psiquiatria Clínica</i> (Página 438).	Indeferido	