

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/2014

Edital nº 044/2014

Especialidade: **TÉCNICO EM ENFERMAGEM**

251

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

- Além deste caderno, você deverá ter recebido o cartão destinado às respostas das questões formuladas na prova; caso não tenha recebido o cartão, peça-o ao fiscal. Em seguida, verifique se este caderno contém enunciadas **trinta questões**.
- Verifique se o número do seu documento de identificação e seu nome conferem com os que aparecem no **CARTÃO DE RESPOSTAS**; em caso afirmativo, assine-o e leia atentamente as instruções para seu preenchimento; caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
- A prova vale 100(cem) pontos, sendo 3,33 (três vírgula trinta e três) pontos o valor de cada questão. Quando for o caso, serão procedidos arredondamentos superiormente.
- Cada questão proposta apresenta cinco alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a correta. No cartão de respostas, atribuir-se-á pontuação zero a toda questão com mais de uma alternativa assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
- Não é permitido portar ou fazer uso de aparelhos de recebimento central de mensagens (*paggers*), aparelho de telefonia celular, qualquer tipo de aparelho que permita intercomunicação, nem material que sirva para consulta ou para auxílio de cálculos.
- O tempo disponível para esta prova, incluindo o preenchimento do cartão de respostas, é de **quatro horas**.
- Colabore com o fiscal, na coleta de sua impressão digital.
- Reserve os quinze minutos finais para preencher o cartão de respostas usando, exclusivamente, caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul.
- Certifique-se de ter assinado a lista de presença.
- Quando terminar, entregue ao fiscal o **CADERNO DE QUESTÕES** e o **CARTÃO DE RESPOSTAS**, que poderá ser invalidado se você não o assinar.

APÓS O AVISO PARA INÍCIO DA PROVA, VOCÊ
DEVERÁ PERMANECER NO LOCAL DE REALIZAÇÃO
DA MESMA POR, NO MÍNIMO, NOVENTA MINUTOS.



01 Com base na lei 7.498/86, cabe ao técnico de enfermagem.

- (A) Assumir chefia de serviço de unidade de enfermagem em instituição de saúde pública ou privada.
- (B) Planejar, organizar, executar e avaliar os serviços de assistência de enfermagem.
- (C) Prestar consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem.
- (D) Participar da orientação e supervisão do trabalho de enfermagem em grau auxiliar.
- (E) Prescrever e evoluir os cuidados de enfermagem.

02 Artigos ou produtos destinados ao contato com a pele íntegra ou aqueles que não entram em contato direto com o paciente, são denominados artigos:

- (A) Semicríticos
- (B) Limpos
- (C) Não-críticos
- (D) Críticos
- (E) Contaminados

03 O processo de destruição de todos os microorganismos presente em um artigo ou instrumental, incluindo os esporos denomina-se:

- (A) Desinfecção
- (B) Esterilização
- (C) Descontaminação
- (D) Degermação
- (E) Descolonização

04 Pode ser considerado taquipnéia no recém-nato quando a frequência respiratória estiver:

- (A) > 30 rpm.
- (B) > 20 rpm.
- (C) > 10 rpm
- (D) < 50 rpm
- (E) > 50 rpm.

05 São sinais e sintomas do choque hipovolêmico:

- (A) Aumento do débito urinário, hipotensão, palidez cutânea e aumento da frequência cardíaca.
- (B) Diminuição da frequência respiratória, pele fria, hipotensão e palidez cutânea.

- (C) Diminuição da frequência cardíaca, aumento da frequência respiratória, aumento do débito urinário e pele fria.
- (D) Aumento do débito urinário, hipertensão, palidez cutânea e aumento da frequência cardíaca.
- (E) Palidez cutânea, aumento da frequência respiratória, aumento da frequência cardíaca e diminuição do débito urinário.

06 Quanto aos aspectos legais referentes à segurança do trabalhador temos várias normas regulamentadoras (NR). A norma regulamentadora que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde é:

- (A) NR 32
- (B) NR 8
- (C) NR 7
- (D) NR 6
- (E) NR 5

07 Processo usado para eliminar bactérias vegetativas, fungos e vírus, no qual se utilizam soluções germicidas, como ácido peracético e glutaraldeído a 2%, é denominado de:

- (A) Assepsia
- (B) Descontaminação
- (C) Desinfecção de nível intermediário
- (D) Desinfecção de alto nível.
- (E) Esterilização

08 A proibição do exercício profissional da enfermagem por um período não superior a 29 (vinte e nove) dias divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos Federal e Regional de Enfermagem, jornais de grande circulação e comunicada aos órgãos empregadores, diz respeito a:

- (A) Advertência verbal;
- (B) Suspensão do exercício profissional;
- (C) Multa;
- (D) Censura;
- (E) Cassação do direito ao exercício profissional.

09 A utilização da máscara com capacidade de filtragem e vedação lateral adequada (Proteção Facial Filtro – PFF2 ou N95), pelo técnico em enfermagem deverá acontecer na:

- (A) Precaução respiratória para aerossóis
- (B) Precaução padrão
- (C) Precaução de contato
- (D) Precaução respiratória para gotículas
- (E) Precaução reversa.

10 Os artigos médico- hospitalares são classificados conforme o potencial de transmissão de infecção. Segundo Spaulding os artigos podem ser considerados críticos, semi-críticos e não críticos, constituindo exemplos de artigos críticos:

- (A) Nebulizadores e umidificadores
- (B) Endoscópios
- (C) Sensor do oxímetro de pulso
- (D) Termômetros axilares
- (E) Fios cirúrgicos e instrumentais cirúrgicos.

11 No pós-operatório imediato um dos problemas respiratórios de maior ocorrência é:

- (A) Broncopneumonia
- (B) Tuberculose
- (C) Atelectasia
- (D) Enfisema
- (E) Tombose

12 É fundamental manusear os materiais perfurocortante com atenção e desprezá-los em recipiente próprio, rígido e impermeável, e que possa ser lacrado após o uso. Por isso, devemos:

- (A) substituir o recipiente quando estiver $\frac{3}{4}$ do volume.
- (B) reencapar as agulhas antes de desprezar em recipiente próprio.
- (C) desprezar todo o material perfuro cortante em saco plástico preto.
- (D) manusear diretamente os bisturis e as agulhas de sutura sem utilizar pinça para descartá-los.
- (E) separar a agulha da seringa antes de desprezar em recipiente próprio.

13 Várias são as recomendações para a prevenção de infecções do sítio cirúrgico e, com base em dados científicos e fundamentos teóricos, podemos definir assepsia como:

- (A) Conjunto de técnicas que tem como objetivo reduzir a microbiota sobre determinadas estruturas orgânicas, geralmente pele e mucosa. Exemplo: degermação das mãos, antebraços e cotovelos.
- (B) Medidas de controle e contenção da disseminação da infecção pela destruição de microorganismos patogênicos. Exemplo: Uso de soluções desinfetantes.

- (C) Medidas de controle e contenção da disseminação da infecção pela destruição de microorganismos patogênicos. degermação das mãos, antebraços e cotovelos.
- (D) Conjunto de técnicas que tem como objetivo evitar a presença de microorganismos em locais que não os contêm. Exemplo: Instalação de dispositivos intravasculares, cateteres da anestesia peridural.
- (E) Conjunto de técnicas que tem como objetivo propagar a presença de microorganismos em locais que não os contêm. Exemplo: Instalação de dispositivos intravasculares, cateteres da anestesia peridural.

1.

14 O cuidado de enfermagem no pós-operatório, embora sujeito a complicações, deve contribuir para a rápida recuperação do paciente e, em relação ao período pós-operatório imediato, este período compreende:

- (A) o tempo delimitado a partir das primeiras vinte quatro (24) horas até a alta hospitalar.
- (B) as primeiras seis (6) horas após o término da cirurgia.
- (C) as primeiras vinte e quatro (24) horas após a intervenção cirúrgica, e inclui cuidados desde a sala de recuperação pós anestésica.
- (D) as quarenta e oito (48) horas após o término da cirurgia e inclui cuidados desde a sala de recuperação pós anestésica.
- (E) apenas o tempo que o paciente encontra-se em recuperação pós anestésica.

15 A síndrome neurológica heterogênea, caracterizada pela instalação de déficits neurológicos – graduais ou abruptos – desencadeados por alterações em território vascular, corresponde a:

- (A) Epilepsia.
- (B) Traumatismo Crânio Encefálico – TCE.
- (C) Trauma medular.
- (D) Neuropatia periférica
- (E) Acidente Vascular Encefálico – AVE.

16 Das alternativas abaixo fazem parte grupo doenças sexualmente transmissíveis a sífilis e:

- (A) HIV, giardíase e papilomavirus humano.
- (B) gonorreia, hepatite B e papilomavirus humano.
- (C) HIV, hanseníase e linfogranuloma venéreo.
- (D) gonorreia, HIV e escabiose.
- (E) diabetes, hanseníase e linfogranuloma venéreo.

17 São cirurgias do trato digestivo:

- (A) diverticulectomia, colecistectomia e colectomia
- (B) diverticulectomia, gastrectomia e safenectomia
- (C) Gastrectomia, hemorroidectomia e esplenectomia
- (D) jejunostomia, esplenectomia e colectomia
- (E) salpingectomia, gastrostomia e jejunostomia

18 Quando afirmamos que a saúde é um direito de todos, integra todas as áreas da vida humana, e que cada pessoa deve ser atendida de acordo com suas necessidades, nos referimos, respectivamente, aos seguintes princípios do Sistema Único de Saúde:

- (A) Integralidade, universalidade e equidade.
- (B) Integralidade, universalidade e igualdade.
- (C) Justiça social, abordagem holística e individualidade.
- (D) Universalidade, integralidade e equidade.
- (E) Direito universal, integralidade, individualidade.

19 A hiperventilação em ritmo crescente, seguida de pausa respiratória é característica do padrão respiratório conhecido por:

- (A) Kussmaul
- (B) Taquipnéico
- (C) Cheyne-Stokes
- (D) Atáxico
- (E) Dispneia

20 A verificação da temperatura corporal do recém nascido prematuro deve ser realizada preferencialmente de forma contínua e assim, baseado nessa afirmativa, a alternativa que represente o local mais utilizado para a instalação no RN do sensor de temperatura da incubadora é o(a):

- (A) Região abdominal de um modo geral;
- (B) Linha média da porção superior do abdômen;
- (C) Reto;
- (D) Membros superiores;
- (E) Porção superior dos membros inferiores.

21 A organização Mundial de Saúde define como faixa de normalidade a temperatura do recém-nascido entre:

- (A) 35,5°C a 37°C
- (B) 35°C a 38°C
- (C) 35,5°C a 38°C
- (D) 36° C e 38°C
- (E) 36,5°C a 37°C

22 Um dos maiores desafios na nutrição do recém-nascido é aumentar as taxas de aleitamento materno exclusivo no momento da alta e após a alta e, neste sentido, melhor representam as estratégias para atingir esse objetivo:

- (A) Encorajar a mãe a estimular a mama e retirar o leite precocemente; Orientar a mãe e familiares sobre a similaridade entre leite materno e formula artificial especial para recém-nascido prematuro;
- (B) Iniciar contato do bebê com o seio materno independentemente da maturidade, do quadro clínico e do peso do recém-nascido;
- (C) Iniciar contato do bebê com o seio materno assim que a maturidade e o quadro clínico permitirem independente do peso do recém-nascido;
- (D) Informar a mãe que o estímulo da mama e a retirada do leite só é necessária quando o recém nascido estiver apto a sugar;
- (E) O contato do bebe com o seio materno só é importante quando o recém-nascido estiver apto a sugar.

23 A fototerapia é um dos tratamentos indicados para os casos de hiperbilirrubinemia, podendo provocar efeitos colaterais como irritação da pele e possível lesão da retina e os cuidados de enfermagem recomendados para esse tratamento são:

- (A) Manter o recém-nascido vestido e imóvel durante todo o tratamento;
- (B) Manter o recém-nascido a uma distancia de 40 a 50 centímetros da luz;
- (C) Dispensar proteção ocular;
- (D) Interromper o tratamento a cada 2 horas;
- (E) Verificar os sinais vitais quando necessário.

24 São cuidados que o técnico de enfermagem deve ter com o paciente em uso de dreno de tórax:

- (A) Manter o frasco de drenagem com a água estéril.
- (B) Manter o frasco de drenagem sem água
- (C) Manter o leito, impreterivelmente, em posição horizontal;
- (D) Proceder à tração diária do dreno para facilitar a cicatrização.
- (E) Medir volume drenado que é sempre resultado de uma infecção.

25 No estudo da estática fetal, ou seja, das relações do feto com o útero materno, se pode afirmar que:

- (A) Atitude fletida é quando há extensão da cabeça em diferentes graus
- (B) Posição transversa, o maior eixo fetal está disposto perpendicularmente ao maior eixo do útero.
- (C) Atitude cefálica é quando a cabeça é a primeira parte fetal que ocupa e transpões o estreito superior.
- (D) Situação longitudinal, os dois maiores eixos estão no mesmo sentido;
- (E) Atitude oblíqua é a relação do dorso fetal com um dos lados da mãe.

26 A terminologia hematemesa é utilizada para:

- (A) Presença de sangue nas fezes.
- (B) Presença de pus na urina.
- (C) Vômito com presença de sangue.
- (D) Aumento dos glóbulos vermelhos
- (E) Presença de sangue no escarro.

27 Paciente masculino de 35 anos, diabético iniciou o tratamento com insulina. O técnico de enfermagem deve estar atento para o rodízio do local de administração, para evitar:

- (A) Lipidimia
- (B) Hipertonia
- (C) Hiperglicemia
- (D) Lipodistrofia
- (E) Hipoglicemia

28 A gasometria arterial é feita a partir de sangue colhido por punção:

- (A) Arterial direta
- (B) De veia profunda
- (C) De calcâneo
- (D) De Acesso venoso periférico.
- (E) Em acesso venoso com hidratação

29 Inalação pode ser definida como:

- (A) Terapia usada para administrar medicamentos, através de aparelho que transforma um medicamento líquido em vapor.
- (B) Administração de oxigênio através da máscara de Venturi.
- (C) Administração de medicamentos líquidos nas narinas
- (D) Terapia utilizada para o tratamento da apnéia.
- (E) Terapia usada para proporcionar ar frio ou quente, sob forma de vapor ou por aerossol.

30 A arrumação da cama é uma técnica que tem por objetivo proporcionar conforto e segurança ao paciente, melhorando também mais rápido e menos cansativo o trabalho da enfermagem, se entendendo que a cama desocupada aguardando um novo paciente é uma cama:

- (A) fechada
- (B) aberta
- (C) de operado
- (D) ocupada
- (E) reservada